



สัตว์รอบมอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

FAUNA OF MFU



20 ปี ที่รอคอย

เรียกชีวิตสัตว์กลับคืนมา

สัตว์รอบมอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

FAUNA OF MFU

ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

FAUNA OF MFU

จัดทำโดย	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	
พิมพ์ครั้งแรก	เมษายน 2562	
จำนวน	3,000 เล่ม	
ที่ปรึกษา	รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้สำรวจและจัดทำข้อมูล	รศ.ดร.ประทีป ดั่งแค ผศ.ดร.อิงอร ไชยยศ นางสาวยุวดี พลพิทักษ์ นางสาวศุภลักษณ์ ศิริ นางสาวนันทนาการ บุญภา	นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน นางสาวอภิษฎา เรืองเกต นางสาวมาละตรีหนึ่ง สีหไกร นายพงษ์สิทธิ์ ศรีคุณเมือง
ภาพถ่าย	นางสาวยุวดี พลพิทักษ์ นางสาวศุภลักษณ์ ศิริ นายอานภาพ จันทร์ลอย นายอนุวัฒน์ นนทอุบล นายดอกกรัก มารอด	นางสาวนันทนาการ บุญภา นายณัฐพงศ์ คงกระพันธ์ นายคุณานนต์ ดาวันไธ นายประทีป ดั่งแค
คณะผู้จัดทำ	อ.ดร.พรรณรวิ พรหมนารท นางสาวรุ่งอรุณ รุ่งรัตนกาล นางสาวหนึ่งฤทัย แสงวิสัย	
ออกแบบรูปเล่ม	นายปภพโชติ อักกะบุตร	
พิมพ์ที่	โรงพิมพ์เอราวัณ การพิมพ์ 28/10 ถ. สิงหาราช ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200	
ISBN	978-616-470-017-8	



บุกเบิก คื่นชีวิตให้ผืนป่า

A photograph of a lush green park. In the foreground, there are several large, mature trees with thick trunks and dense green foliage. A winding path made of light-colored stones or bricks leads through the grassy area. The path curves to the right and then back to the left. In the background, more trees and a multi-story building with a tiled roof are visible. The sky is blue with some light clouds. The overall scene is bright and sunny, with long shadows cast by the trees onto the grass.

พัฒนา

สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

ดูแลรักษา
ให้คงอยู่คู่ มฟล.





ดอยแจ่ม พ.ศ. 2541



ดอยแจ่ม พ.ศ. 2562

คำนำ

หนังสือ “สัตว์รอบมอ” เป็นการรวบรวมสัตว์ประเภทต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกว่า 5,000 ไร่ เพื่อให้เห็นถึงความสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และสัตว์เลื้อยคลาน รวมมากกว่า 200 ชนิด โดยความหลากหลายของสัตว์ในมหาวิทยาลัยนี้ เป็นผลที่เกิดจากการพลิกฟื้นคืนผืนป่าบนดอยแห่งมดตลอดระยะเวลา 20 ปี ของคนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคน

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ดั่งแข และคณะผู้สำรวจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สละเวลากว่าหนึ่งปีเต็มในการเข้าสำรวจและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าหนังสือ “สัตว์รอบมอ” จะเป็นบันทึกประวัติของสัตว์ในมหาวิทยาลัยเพื่อไว้ศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจตามสมควร และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญของการสร้าง ดูแล และรักษาผืนป่าอย่างแท้จริง

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ในวันที่ 28 เมษายน 2562 คณะผู้จัดทำและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดทำหนังสือ “สัตว์รอบมอ” ไว้เป็นที่ระลึก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติและรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
ความนำจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	11
สัตว์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	13
ชนิดและจำนวนของสัตว์ที่พบ	24
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	25
นก	40
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก	205
สัตว์เลื้อยคลาน	223
บรรณานุกรม	246
รายชื่อสัตว์	248
ดัชนีชื่อไทย	262
ดัชนีชื่อสามัญ	266
ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์	270



ความนำ

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เราเดินเข้ามาที่ดอยแม่มด้วยความมุ่งมั่นว่าเราจะสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ที่แห่งนี้ เวลานั้น...บนดอยแม่มและผืนป่าโดยรอบอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม สิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยก็มีเหลืออยู่ไม่มาก สัตว์ที่ควรจะมีมากโดยเฉพาะนกก็พบอยู่ไม่กี่ชนิด สัตว์ป่าขนาดใหญ่แทบไม่มีเหลืออยู่เลย สัตว์ที่พบเห็นมากที่สุดคงจะเป็นพวกแมลงต่าง ๆ และสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของดอยแม่มล้วนมาจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นความตั้งใจที่จะพลิกฟื้นคืนผืนป่าให้ดอยแม่มจึงเกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเมื่อผืนป่าอุดมสมบูรณ์ บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยอยู่ ณ บริเวณถิ่นที่แห่งนี้ก็จะหวนกลับคืนมาสู่ดอยแม่มอีกครั้งหนึ่ง

ยี่สิบปีผ่านไป การปลูกป่าและทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องที่ดอยแม่ม อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจ ด้วยความรักผืนป่าและด้วยความรักในธรรมชาติของคนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกหมู่เหล่า

ในวันนี้ ด้วยความอยากรู้ว่าสัตว์ในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง จึงนำมาสู่การจัดตั้งคณะสำรวจเพื่อค้นหา ศึกษา และวิเคราะห์ขึ้น โดยในเบื้องต้นคณะศึกษาและวิจัยได้รับโจทย์เพียงให้ศึกษาหาชนิดและจำนวนของนก ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นง่ายและมากที่สุด แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทำการสำรวจไปแล้ว คณะสำรวจได้พบสิ่งมีชีวิตประเภทต่าง ๆ อีกหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันในผืนป่า อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้ ดังนั้นจากความคิดเดิมที่ตั้งใจจะศึกษารวบรวมเฉพาะนกประเภทต่าง ๆ จึงขยายออกไปเป็นการรวบรวมสัตว์ในมหาวิทยาลัยเท่าที่สำรวจได้ในเวลาหนึ่งปีไปด้วยกันทั้งหมด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข หากเข้าใจในธรรมชาติของกันและกันและไม่เบียดเบียนกัน ณ วันนี้ คนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสุขอยู่ท่ามกลางป่าไม้ ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัย ชีวิตคนในมหาวิทยาลัย จึงอยู่กับธรรมชาติที่ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่างลงตัว

หนังสือสัตว์รอบมอเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า 20 ปีที่รอคอยนั้น ชีวิตสัตว์ได้วนกลับคืนมาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว และจะเป็นการจดบันทึกประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไว้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในอนาคตต่อไป อีกทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคนทั่วไปเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของธรรมชาติ มีความรักในธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สัตว์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ถิ่นอาศัย


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 5,000 ไร่ ปัจจุบันภายในรั้วมหาวิทยาลัยมีลักษณะพื้นที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่ที่ราบเชิงดอย ยอดดอย แหล่งน้ำ และทุ่งหญ้า เป็นต้น ส่งผลให้เกิดถิ่นที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อสัตว์นานาชนิดชนิดที่เข้ามาหากิน และทำรังวางไข่ ในอดีตพื้นที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่โล่งจนแทบไม่มีสัตว์เข้ามาอาศัยและใช้ประโยชน์ แต่หลังจากมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น มีการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเขียวชอุ่ม มีพรรณไม้ให้ผลหลายชนิดที่มหาวิทยาลัยที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกผล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อสัตว์ นอกจากนี้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังเป็นประตูเปิดรับนกอพยพที่อพยพหนีหนาวเข้ามาในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นจุดพักที่ดีก่อนที่นกอพยพจะกระจายตัวลงไปตามทางใต้ของประเทศต่อไป ดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต การสำรวจและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทราบถึงทรัพยากรสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

จุดสำรวจและวิธีการสำรวจ

จุดสำรวจ


คณะสำรวจได้แบ่งจุดสำรวจสัตว์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกเป็น 5 จุดสำรวจ ประกอบด้วย

1. จุดสำรวจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
2. จุดสำรวจตามอาคารเรียนและอาคารที่พักอาศัย
3. จุดสำรวจจากสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เถลิงพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ไปอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1
4. จุดสำรวจอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 2
5. จุดสำรวจดอยแง่ม




1. จุดสำรวจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

จุดสำรวจที่ 1 เริ่มจากป้ายหน้ามหาวิทยาลัย เดินสำรวจไปตามถนนและสิ้นสุดบริเวณป้อมยาม ก่อนถึงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลักษณะเด่นของจุดสำรวจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย คือ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นริมสองข้างทางและบริเวณเกาะกลางถนน ส่วนใหญ่เป็นไม้จำพวกไทร ในช่วงที่ไทรสุกจัดเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับนกกินผลไม้ ส่วนต้นปีบบริเวณเกาะกลางถนนในช่วงออกดอกมีนกกินน้ำหวานและนกกินแมลงเข้าใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นชนิดไม้ที่พบบนเข้ามาทำรังหลายชนิด เช่น นกปรอดสวน นกกระต๊อขี้หมู และนกกิ้งโครงคอดำ เป็นต้น






2. จุดสำรวจตามอาคารเรียนและอาคารที่พักอาศัย



จุดสำรวจที่ 2 เป็นโซนสำรวจบริเวณอาคารเรียน อาคารที่พักอาศัย และอาคารต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวร และมีการทำกิจกรรมของมนุษย์ แต่บริเวณดังกล่าวยังมีความร่มรื่นจากไม้ดอกไม้ประดับขนาดเล็กไปจนถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่ขึ้นกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจและความพยายามสร้างสรรค์ให้อาคารต่าง ๆ มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ส่งผลให้นกป่าหลายชนิดแวะเวียนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น นกแว่นตาขาวสีทอง นกคัคคูมรกต นกจับแมลงสีน้ำตาล และนกกระเต็นน้อยธรรมดา เป็นต้น




3. จุดสำรวจจากสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ไปอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1

จุดสำรวจที่ 3 เริ่มจากอ่างเก็บน้ำสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา สำรวจไปตามถนนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1 ลักษณะพื้นที่ตลอดเส้นทางสำรวจมีความหลากหลายของประเภทถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เช่น พงหญ้าและทุ่งหญ้ารกทึบ เป็นบริเวณที่มีวัชพืช ไม้เถา พืชล้มลุกขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ถิ่นอาศัยแบบพงหญ้ามักเป็นแหล่งหลบภัยและซ่อนตัวจากสัตว์ผู้ล่าได้ดี



4. จุดสำรวจอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 2


จุดสำรวจที่ 4 เป็นเส้นสำรวจที่ตัดออกจากจุดสำรวจที่ 3 มุ่งตรงไปยังอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 2 บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเป็นพงหญ้ารกทึบมีวัชพืชขึ้นอยู่หนาแน่น ภายในอ่างเก็บน้ำพบไม้ยืนต้นตายซึ่งเป็นจุดที่พบเหยี่ยว นกนางแอ่นบ้าน นกยางกรอกพันธุ์จีน และนกนางแอ่นลาย ซึ่งเกาะนิ่งบนกิ่งไม้แห้ง นอกจากนี้ตามขอบอ่างมีพืชน้ำกลุ่มบอนขึ้นกระจายแผ่เป็นแนวยาว เป็นบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการซ่อนตัวหากินของนกน้ำหลายชนิด เช่น นกอัญชันหางดำ นกอีล่า และนกอัญชันคิ้วขาว เป็นต้น ในช่วงฤดูหนาวมักพบเห็นเป็ดแดงลอยเกาะกลุ่มเป็นฝูงขนาดใหญ่



5.จุดสำรวจดอยแง่ม

จุดสำรวจที่ 5 เป็นตัวแทนพื้นที่ป่าธรรมชาติ เริ่มสำรวจจากบริเวณวิหารพระเจ้าล้านทอง ขึ้นไปบนยอดดอยแง่ม ลักษณะสังคมพืชบนดอยแง่มเป็นป่าผสม

ผลัดใบ มีไม้ขึ้นกระจายครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ในช่วงหน้าแล้งตามพื้นดินมีใบไม้และใบไม้หล่นทับถมหนาแน่น ในช่วงหน้าฝนมีหญ้าขึ้นสูงตลอดทางขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม นกที่พบส่วนใหญ่เป็นนกชายป่า เช่น นกปรอดทอง นกกางเขนดง นกกินแมลงอกเหลือง และนกจับแมลง คอน้ำตาลแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นจุดสำรวจที่คนงานบอกเล่าว่ามีการพบเห็นงูจงอางอยู่เป็นประจำ



วิธีการสำรวจ

การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการโดยแบ่งกลุ่มสัตว์ที่สำรวจออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และ สัตว์เลื้อยคลาน และสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 17.00 น. และภาคสนามตอนกลางคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 - 21.00 น. เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสำรวจที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสัตว์แต่ละกลุ่ม เมื่อพบทำการบันทึกชนิดและถ่ายภาพสัตว์ ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 5 วิธี ดังนี้

1. การสำรวจโดยการพบเห็นตัวโดยตรง (Direct observation)



2. การวางกรงดักสัตว์ (Live trap)



3. การวางตาข่ายดักสัตว์ (Mist net)



4. การวางกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera trap)



5. การวางหลุมดักสัตว์ (Pit fall)



หมายเหตุ

การถ่ายภาพสัตว์บางชนิดต้องถ่ายภาพจากระยะไกล ทำให้บางภาพไม่ชัดเจน และสัตว์บางชนิดไม่สามารถบันทึกภาพได้ จึงต้องใช้รูปวาดแทน ผู้จัดทำจึงขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

สถานภาพการอนุรักษ์

คณะสำรวจได้ทำการศึกษาสถานภาพการอนุรักษ์อ้างอิงจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. สถานภาพการอนุรักษ์ตามการประเมินขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature; IUCN) (<https://www.iucnredlist.org/>) โดยแบ่งสถานภาพออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

สถานภาพ:	สูญพันธุ์	Extinct (EW)
	สูญพันธุ์ในธรรมชาติ	Extinct in the Wild (EW)
	ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	Critically Endangered (CR)
	ใกล้สูญพันธุ์	Endangered (EN)
	มีแนวโน้มสูญพันธุ์	Vulnerable (VU)
	ใกล้ถูกคุกคาม	Near Threatened (NT)
	กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด	Least Concern (LC)
	ข้อมูลไม่เพียงพอ	Data Deficient (DD)

2. สถานภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในประเทศไทยตามการประเมินของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปี 2560 ซึ่งแบ่งสถานภาพออกเป็น 8 กลุ่ม เช่นเดียวกับ IUCN แต่พิจารณาประชากรสัตว์มีกระดูกสันหลังเฉพาะในประเทศไทย

3. สถานภาพการอนุรักษ์ตามกฎหมายของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2535 (สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2562) แบ่งเป็น สัตว์ป่าสงวน (**ส**) สัตว์ป่าคุ้มครอง (**ค**) และไม่ถูกจัดไว้ในบัญชีรายชื่อ (-)

นอกจากนี้คณะสำรวจยังได้แบ่งสถานภาพของนกในประเทศไทยตามฤดูกาลในรอบปี เป็น 4 สถานภาพ (จารุจินต์ และคณะ, 2555) ดังนี้

1. **นกประจำถิ่น (resident)** หมายถึงนกที่พบเห็นได้ตลอดทั้งปี อาจมีการทำรังวางไข่หรือคาดว่าจะทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกในบริเวณนั้น

2. **นกอพยพ (winter visitor)** หมายถึงนกที่ทำรังวางไข่ในบริเวณอื่น มักเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชีย ในฤดูหนาวราวเดือนกันยายน-ตุลาคม จะย้ายถิ่นลงมาอยู่ในประเทศไทย และย้ายถิ่นกลับในราวเดือนเมษายน-พฤษภาคมของปีถัดไป


3. **นกอพยพผ่าน (passage migrant)** หมายถึงนกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพที่มีการย้ายถิ่นในฤดูหนาวของทุกปี แต่หยุดพักในประเทศไทย เพื่อพักหาอาหารเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เป็นการสะสมไขมันก่อนจะบินต่อไปทางทิศใต้

4. **นกอพยพมาทำรังวางไข่ (breeding visitor)** หมายถึงนกบางชนิดที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยเพียงเพื่อทำรังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว

ชนิดและจำนวน

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้ดำเนินการสำรวจ พบชนิดของสัตว์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 213 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 13 ชนิด นก 161 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 17 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 22 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันเป็นบ้านหลังใหญ่ให้กับสัตว์หลายชนิดได้เข้ามาอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนกที่พบความหลากหลายชนิดมากที่สุด เมื่อพิจารณาชนิดนกอ้างอิงตามสถานภาพตามฤดูกาลพบว่าร้อยละ 24 จัดเป็นนกอพยพ การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติทำให้มีแหล่งทรัพยากรอย่างเพียงพอ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อนกประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ตลอดทั้งปีและนกอพยพที่แวะเวียนเข้ามาในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ดังนั้นการสำรวจและติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะทำให้ทราบถึงการคงอยู่และความเพิ่มพูนของชนิดพันธุ์ในอนาคตต่อไป

ชนิดและจำนวนของสัตว์ที่พบ



สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Mammals



MASCOT ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



เป็นที่รู้จักกันว่า มาสคอตประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ “น้องตุ่น” ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตอแย้มมากก่อนที่จะมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น น้องตุ่นที่เราเรียกกันจริงๆ นั้น คือ ตัวอ้น เนื่องจากคนทางภาคเหนือนิยมเรียก “อ้น” ว่า “ตุ่น” ดังนั้นเรามาทำความรู้จักข้อมูลทางวิชาการของมาสคอตประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกัน

อ้น (Bamboo Rat) เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ จัดอยู่ในอันดับ Rodentia วงศ์ Spalacidae อาศัยอยู่ใต้ผิวดิน ลักษณะลำตัวกลม อ้วนล่ำและสั้น หางและขาสั้น ตาขนาดเล็ก อ้นมีขนหนานุ่มปกคลุมทั่วตัว หางไม่มีขน กินรากพืชโดยเฉพาะไผ่เป็นอาหาร ในประเทศไทย พบอ้น 3 ชนิด ประกอบไปด้วย อ้นใหญ่ (Large Bamboo Rat) อ้นกลาง (Hoary Bamboo Rat) และอ้นเล็ก (Bay Bamboo Rat) ซึ่งชนิดหลังเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้บ่อยในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



อ้นใหญ่ (*Rhizomys sumatrensis*)

ขนาดตัว: 26-48 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ



อ้นกลาง (*Rhizomys pruinosus*)

ขนาดตัว: 27-35 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่ ส่วนใหญ่พบในดงเขา



อ้นเล็ก (*Cannomys badius*)

ขนาดตัว: 14.5-26.5 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่ในป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ

ชื่อสามัญ

Bay Bamboo Rat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cannomys badius

ชื่อวงศ์

Spalacidae

ชื่ออันดับ

Rodentia



อันเล็ก เป็นอันที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ขนาดเล็กกว่าอันใหญ่เกือบเท่าตัว ขนสีน้ำตาลแดงเกือบทั่วทั้งลำตัว แก้มสีน้ำตาลอ่อน ลักษณะรูปร่างค่อนข้างลำ ในอันเล็กบางตัวพบแถบสีขาวคาดจากปลายจมูกถึงหน้าผาก ฝ่าตีนเรียบ มีพื้นหน้า ขนาดใหญ่สำหรับขุดโพรงดิน ใช้ฟันแทะไม้ไผ่และหน่อไม้กินเป็นอาหาร นอกจากนี้ ยังกินลูกไม้ต่าง ๆ ที่หล่นอยู่ตามพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่อาศัย โดยในมหาวิทยาลัยพบบ่อย ในบริเวณแปลงปลูกต้นชากระ มักจะออกหากินในเวลากลางคืนและพลบค่ำ

บริเวณที่พบ จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สพ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	NT	LC	☀	☀/☁	☀	☀	☀/☁	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

ตุ่น, ตีง



ชื่อสามัญ
Kloss's Mole
ชื่อวิทยาศาสตร์
Euroscaptor klossi
ชื่อวงศ์
Talpidae
ชื่ออันดับ
Eulipotyphla

ตุ่นหรือตีง เป็นสัตว์ที่มีตีนคู่หน้าคล้ายใบพาย หางกุด ไม่มีใบหู ตามีขนาดเล็กมากเนื่องจากอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน ตีนคู่หน้าแข็งแรงใช้ในการขุดดิน ลักษณะกองดินของตุ่นมีความเฉพาะ ในส่วนของอาหาร กินแมลงและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินเป็นอาหาร ออกหากินในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยตามแปลงดอกไม้ ตามสวน บริเวณที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

บริเวณที่พบ
จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	VU	LC												

ชื่อสามัญ
Pallas's Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์
*Callosciurus
erythraeus*

ชื่อวงศ์
Sciuridae

ชื่ออันดับ
Rodentia



กระรอกทองแดง เป็นกระรอกขนาดกลาง มีสีขนหลายสี ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว ท้องสีน้ำตาลแดง มีปื้นสีดำทางส่วนท้ายของหลัง หางเป็นแถบสีเนื้อสลับดำจาง ๆ กินผลไม้เป็นอาหาร พบหากินบนต้นไม้ ตามป่าโปร่ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะหากินในเวลากลางวัน บริเวณบนต้นไม้ โดยใช้มือคีบผลไม้ นั่งกัดแทะผลไม้และห้อยตัวกิน

บริเวณที่พบ
จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC	☀	☀/☁	☀	☀	☀/☁	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

กระเล็นขนปลายหูสั้น



ชื่อสามัญ

Himalayan Striped Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tamiops mccllellandii

ชื่อวงศ์

Sciuridae

ชื่ออันดับ

Rodentia

กระเล็นขนปลายหูสั้น เป็นกระรอกที่มีขนาดเล็กมาก หลังมีลายแถบสีดำ 5 แถบสลับกับแถบสีจาง 4 แถบ แถบสีจางด้านนอกกว้างกว่าแถบบนใน หน้าผากและกระหม่อมสีเขียว ลำตัวด้านข้างและขาสีเทา ท้องสีออกส้ม หางเรียวยาว มีจุดประสีเทา น้ำตาล และดำ กินผลไม้ชนิดต่าง ๆ และแมลงเป็นอาหาร พบหากินบนต้นไม้ ในชั้นเรือนยอด ชั้นกลางและชั้นบน โดยจะหากินในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อยมาก ในบริเวณใกล้เคียงกันกับกระรอกทองแดง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมวิ่งหลบไปมาบนกิ่งไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3, 4 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

กระจ๊วน, กระรอกดินข้างลาย

ชื่อสามัญ

Indochinese Ground
Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์

Menetes berdmorei

ชื่อวงศ์

Sciuridae

ชื่ออันดับ

Rodentia



กระจ๊วน หรือกระรอกดินข้างลาย เป็นกระรอกดินขนาดกลาง จมูกยาว ลำตัวด้านข้างมีแถบสีเข้มสลับจาง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดงแกมแดง ลำตัวด้านล่างมีสีเนื้อจาง หางสั้นกว่าลำตัว กินผลไม้ แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร พบหากินบนพื้นดินในป่า อาจปีนต้นไม้ขึ้นไปบนเรือนยอดระดับต่ำ และระดับกลางตามป่าเกือบทุกประเภท จะออกหากินในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อยนัก โดยมักจะพบขณะวิ่งข้ามถนน

บริเวณที่พบ


จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

หนูบ้านท้องขาว



ชื่อสามัญ
Oriental House Rat
ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus tanezumii
ชื่อวงศ์
Muridae
ชื่ออันดับ
Rodentia



และสัตว์ จัดเป็นกลุ่มที่กินอาหารได้หลากหลาย พบตามพื้นที่เปิดโล่งและทุ่งหญ้า โดยจะออกหากินในเวลากลางคืน บางพบครั้งในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อยขณะเดินหากินในตอนกลางคืนตามพื้นที่มีใบไม้แห้งร่วงหล่น

หนูบ้านท้องขาว เป็นหนูขนาดกลาง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลมะกอกแกมเทา บางครั้งพบสีออกโทนเทาหรือแดง ลำตัวด้านล่างมักเป็นสีน้ำตาล-ขาว พื้นสีเทา บางครั้งสีขาวครีม หนูขนาดใหญ่มีขนเล็กน้อยหางมีความยาวเท่ากับลำตัว ส่วนใหญ่กินทั้งพืช

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ
Etruscan Shrew

ชื่อวิทยาศาสตร์
Suncus etruscus

ชื่อวงศ์
Soricidae

ชื่ออันดับ
Eulipotyphla



หนูผีจิ๋ว เป็นหนูผีขนาดเล็กมาก ลำตัวด้านบนมีสีเทาเข้มแกมขาวอมเทา ลำตัวด้านล่างสีซีดหุและเท้าสีน้ำตาลเข้ม หางปกคลุมด้วยขนสั้นและหนาแน่น กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร จะออกหากินในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัยจะพบตามพื้นที่โล่งในบริเวณพงหญ้า ซึ่งจะหาพบค่อนข้างยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่



ชื่อสามัญ

Greater Long-nosed
Fruit Bat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macroglossus sobrinus

ชื่อวงศ์

Pteropodidae

ชื่ออันดับ

Chiroptera

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ เป็นค้างคาวขนาดเล็ก ไม่มีหาง จมูกยาวเรียว ใบหูขนาดกลางสีน้ำตาล ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแกมเหลือง กินน้ำต้อยและเกสรดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกล้วยเป็นอาหาร ออกหากินในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบในบริเวณที่มีตึกกล้วยขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งหาพบยาก



บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	❄️	❄️

ค้างคาวหน้ายักษ์

ชื่อสามัญ

Leaf-nosed Bat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hipposideros sp.

ชื่อวงศ์

Hipposideridae

ชื่ออันดับ

Chiroptera



ค้างคาวหน้ายักษ์เป็นค้างคาวกินแมลง ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง แผ่นจมูกหน้ามีลักษณะคล้ายเกือกม้า ตามีขนาดเล็กและมีหูค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ ขนาดตัว ค้างคาวกินแมลงจะออกหากินในเวลา กลางคืน โดยใช้คลื่นเสียงในการสะท้อนหาตำแหน่ง ของเหยื่อ (echolocation) ในมหาวิทยาลัย สำรวจพบเพียงครั้งเดียว บริเวณกอไผ่ใกล้ลำห้วย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	-	-												

กระแตเหินือ



ชื่อสามัญ
Northern Tree Shrew
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tupaia belangeri
ชื่อวงศ์
Tupaiaidae
ชื่ออันดับ
Scandentia



เป็นสัตว์ที่พบบ่อยและมีความชุกชุมมากที่สุด
ส่วนใหญ่พบเห็นขณะหยุดและวิ่งหากินตามพื้น
มีความระแวดระวังภัยสูง เมื่อตกใจจะวิ่งหนีไปทันที

บริเวณที่พบ

พบได้ในทุกเส้นสำรวจ

กระแตเหินือ เป็นกระแตขนาดใหญ่ ปลายจมูกยาวแหลมและหางเป็นพู่เรียวยาว หางยาวเท่ากับ ความยาวลำตัว ไหล่มีแถบสีขาวขีด กินได้ทั้งพืช และสัตว์อย่างแมลง หรือหนอนเป็นอาหาร พบได้ในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ป่าละเมาะ จะออกหากินในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัย

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ
Otter

ชื่อวิทยาศาสตร์
Aonyx sp.

ชื่อวงศ์
Mustelidae

ชื่ออันดับ
Carnivora



นาก ขนาดตัวเล็ก อ้วนลำ ตีนบางส่วนมีลักษณะเป็นพังผืด หูสั้น สีสันน้ำตาลแกมเทาเข้ม ขนลำตัวด้านล่างมีสีจางกว่า กินหอย ปู สัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ และสัตว์มีเปลือกแข็งเป็นอาหาร ออกหากินได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยพบเพียงครั้งเดียว จำนวน 1 ตัว บริเวณข้างถนนก่อนกระโดดเข้าตงกล้วยที่มีน้ำขัง ในช่วงเช้าขณะเดินสำรวจนก ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญ เนื่องจากนากเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จากอดีตเป็นพื้นที่เคยรกร้างว่างเปล่า


กลับพื้นที่คืนสภาพจนสามารถดึงดูดให้นากกลับเข้ามาอาศัยอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ได้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	VU	VU												

หมาหรีง



ชื่อสามัญ

Large-toothed Ferret
Badger

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melogale personata

ชื่อวงศ์

Mustelidae

ชื่ออันดับ

Carnivora

หมาหรีง มีลักษณะหน้าแหลม จมูกค่อนข้างโต ขาสั้น ขาหน้ามีเล็บยาว หางค่อนข้างใหญ่ ขนทางสีเทาฟูเป็นพวง หัวและหน้าตลอดจนลำคอด้านบนมีสีน้ำตาลคล้ำ มีแต้มสีขาวที่หน้าผากและข้างแก้ม เป็นสีจาง กลางหัวมีแถบสีขาวพาดไปถึงต้นคอ ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนอมเทา หมาหรีงมีกลิ่นตัวที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำตัวส่วนหลัง ในจุดที่อยู่ใกล้กันจะมีต่อมผลิตกลิ่นเหม็น ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันการคุกคามจากผู้ล่า

หมาหรีงอาศัยอยู่บนพื้นดิน กินได้ทั้งผลไม้ และ สัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไล่เตียน ตัวง และ ตั๊กแตน ในมหาวิทยาลัยพบบริเวณสวนสมุนไพร ออกหากิน ในเวลากลางคืน โดยหาพบค่อนข้างยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา

ชื่อสามัญ
Asian Palm Civet

ชื่อวิทยาศาสตร์
*Paradoxurus
hermaphroditus*

ชื่อวงศ์
Viverridae

ชื่ออันดับ
Carnivora



อีเห็นข้างลาย หรือ อีเห็นธรรมดา มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ สีขนเทาเข้มไปจนเกือบดำ บริเวณกลางหลังมีจุดสีดาขนาดเล็กเรียงเป็นแนวยาว 3 แถว หางยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว ปลายหางครึ่งหลังค่อนข้างดำ กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ เป็นตัวช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ (seed disperser) ที่ดีให้กับต้นไม้ในป่าเขตร้อน ในมหาวิทยาลัยพบเห็นตัวเพียงครั้งเดียวในเดือนกันยายน

แต่พบเห็นกองมูลบนถนนทุกเดือนที่ทำการสำรวจ มักจะออกหากินในเวลากลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

นก
Birds



ขนาดตัวนก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้



1. ขนาดเล็กมาก ตั้งแต่ 8-17 ซม.



2. ขนาดเล็ก ตั้งแต่ 14-35 ซม.



3. ขนาดกลาง ตั้งแต่ 38-78 ซม.



4. ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 78-90 ซม.



5. ขนาดใหญ่มาก ตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไป

นกกะลิง



ชื่อสามัญ

Grey-headed Parakeet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psittacula finschii

ชื่อวงศ์

Psittacidae

ชื่ออันดับ

Psittaciformes



แผนที่การกระจายของนกกะลิง (BirdLife International and Handbook of the Birds of the World, 2016)

นกกะลิง มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ เช่น นกกะลิงกะแล นกกะแล นกกาลิง ซึ่งทางภาคเหนือมักเรียกกันว่า นกแล นกแลเป็นชื่อเพลงของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อว่า นกแล วงดนตรีที่ประกอบไปด้วยเด็กเหนือที่รวมตัวกัน หากทุกคนยังพอจำกันได้ ในเนื้อเพลงมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ร้องว่า “นกแล ก็คือ

นกแก้ว เสียงแจ้ว ๆ เป็นหยิ่งใดจา” เป็นเพลงที่เคยโด่งดังมากในอดีตที่ผ่านมา

นกกะลิง มีชื่อสามัญว่า Grey-headed Parakeet เนื่องจากนกเพศผู้และเพศเมียมีหัวสีเทาชัดเจน ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ คือ *Psittacula finschii* จัดอยู่ในอันดับ Psittaciformes วงศ์ Psittacidae ซึ่งเป็นกลุ่มนกแก้วที่มีลักษณะปากจุ่มแหลม ในประเทศไทยกลุ่มนกแก้วที่มีหางยาว มีรายงาน 5 ชนิด ได้แก่ นกแก้วโม่ง นกแก้วหัวแพร นกแขกเต้า นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ นกกะลิง และนกกะแล เมื่อเปรียบเทียบความยาวหางของนกแก้วทั้ง 5 ชนิด จะพบว่านกกะลิงเป็นนกแก้วที่มีความยาวของหางยาวกว่านกแก้วทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้สีของหางยังสวยสดใส หางครึ่งบนมีสีฟ้า หางครึ่งล่างมีสีเหลือง

การกระจายของนกกะลิง พบกระจายในอินเดีย บังคลาเทศ ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ในประเทศไทยนกกะลิง เป็นนกประจำถิ่น มีการทำรังวางไข่และเลี้ยงดูลูกนก ในประเทศไทย ทำรังตามโพรงไม้ในธรรมชาติ พบได้ ในป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง และบางครั้งพบตามพื้นที่ เกษตรกรรม เป็นนกที่พบได้ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง 1,900 เมตร

นกกะลิงเป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีขนาด จากปลายปากถึงหางยาวประมาณ 36 - 46 ซม. ปากจัมแหลม ด้านบนสีแดง ส่วนปากล่างสีส้ม หัวสีเทาคอหอยสีดํารอบคอเป็นวงสีดำนกเพศผู้บริเวณ ช่วงไหล่มีแถบสีแดง เป็นนกที่บินเร็ว กินเมล็ดไม้ ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบเกาะตามกิ่งไม้แห้งเป็นฝูงขนาดใหญ่มากกว่า 30 ตัว ตามจุดสำรวจที่ 3 มักบินวนไปมาหลายรอบ ก่อนลงเกาะตามเรือนยอดไม้ทั้งต้นที่มีกิ่งโล่งและมีใบแน่นทึบ เช่น ต้นสัก พบเป็นประจำในช่วงเช้า และเย็น พบเห็นตัวได้ยากเนื่องจากสีลำตัว

มีความกลมกลืนกับใบไม้ หากตกใจจะบินและ ส่งเสียงร้องแหลมสั้น “สว๊ต”

ข้อมูลสถานภาพการอนุรักษ์ จัดเป็นสัตว์ป่า คุ่มครอง และเมื่อพิจารณาตามการประเมินของ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ พบว่านกกะลิงมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) ในระดับโลก ส่วนในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern) จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าประชากรในระดับโลก มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในประเทศไทยพบน้อยในทาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตกตอนเหนือ และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจนกกะลิงในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดปี 2561 สามารถพบเห็นฝูงนกกะลิงได้ตลอดทั้งปี จากข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นหลักฐาน ที่ช่วยยืนยันว่ามหาวิทยาลัยมีพื้นที่อาศัยที่เหมาะสม สำหรับนก มีแหล่งทรัพยากรในธรรมชาติที่จำเป็น สำหรับการดำรงอยู่ของนกชนิดพันธุ์นี้อีกด้วย

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	NT												

เปิดแดง



ชื่อสามัญ

Lesser Whistling Duck

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Dendrocygna
javanica*

ชื่อวงศ์

Anatidae

ชื่ออันดับ

Anseriformes

เปิดแดง เป็นนกขนาดเล็ก – กลาง มีขนาดตั้งแต่ 40 – 43 ซม. ลำตัวสีน้ำตาลแกมเหลือง ปากแบน และกว้าง เพศผู้และเพศเมียมีสีขนเหมือนกัน คออยู่ต่ำกว่าลำตัวในขณะที่บิน เสียงร้องแหลมสูง คล้ายเสียงนกหวีด ในช่วงกลางวันพบลอยน้ำ เป็นกลุ่มใหญ่และไม่ส่งเสียงร้อง อาหารที่เปิดแดงกิน เช่น สาหร่าย แหน แมลงตามพืชลอยน้ำ กุ้ง หอย ปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ หากินในช่วงเวลากลางคืน ทำรังในกอหญ้า กอกกในบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ในมหาวิทยาลัยจะอาศัยอยู่ตามบึง อ่างน้ำ แหล่งน้ำ

ขนาดใหญ่ในธรรมชาติ โดยพบเห็นลอยตัวบนผิวน้ำ เป็นฝูงจำนวนมาก บางครั้งบินผ่านเป็นกลุ่ม 2 - 3 ตัว พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น บางประชากรเป็นนกอพยพ นอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Rain Quail

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Coturnix
coromandelica*

ชื่อวงศ์

Phasianidae

ชื่ออันดับ

Galliformes



นกคุ่มอกดำ เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 17-18 ซม. รูปร่างอ้วนป้อม คีวขาวเพศผู้และเพศเมีย มีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน กลางคอมีเส้นสีดำ ออกดำเป็นปื้น ท้องสีขาวมีลายจุดสีดำกระจาย บริเวณท้องเป็นลักษณะที่พบในนกคุ่มอกดำเพศผู้ ส่วนเพศเมียไม่มีลักษณะดังกล่าว กินเมล็ดพืชต่าง ๆ และแมลงตามพื้นหญ้า ในมหาวิทยาลัยพบบริเวณ ข้างทางที่มีพงหญ้ารกทึบ โดยจะพบไม่บ่อยนัก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	NT	LC												

ไก่ป่า



ชื่อสามัญ
Red Junglefowl
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gallus gallus
ชื่อวงศ์
Phasianidae
ชื่ออันดับ
Galliformes

ไก่ป่า เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ ลักษณะคล้าย ไก่บ้าน เพศผู้และเพศเมียมีขนาดตัวและสีขนแตกต่างกัน เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย (เพศผู้ 65-78 ซม. เพศเมีย 41-46 ซม. เพศผู้มีหงอนใหญ่ ใบหน้าและหงอนมีสีแดง ขามีเดือยแหลมข้างละ 1 เดือย เพศเมีย หงอนขนาดเล็กกว่าเพศผู้ ขาไม่มีเดือย เพศผู้ร้องขึ้นในตอนเช้า ส่วนเพศเมียส่งเสียงร้อง กะตัก เมื่อตกใจหรือมีสิ่งรบกวน อาหารของไก่ป่า เช่น เมล็ดพืช แมลง ไข่เดือนและหนอนตามพื้นดิน ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเดินหากิน

ตามพื้นดิน บริเวณป่าไผ่ ทุ่งหญ้าในพื้นที่โล่ง หรือบนถนน พบเห็นอยู่เป็นครอบครัว ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงร้อง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	☀	☀/☀	☀	☀	☀/☁	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

ชื่อสามัญ

Little Grebe

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tachybaptus ruficollis

ชื่อวงศ์

Podicipedidae

ชื่ออันดับ

Podicipediformes



นกเป็ดผีเล็ก เป็นนกเป็ดน้ำขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 25 – 29 ซม.ปากมีลักษณะแหลมเล็ก มีสีเหลือง บริเวณปลายปากและมุมปาก ท้ายทอยลากยาวไปถึงหลังมีสีน้ำตาลเข้ม หางสั้น ช่วงฤดูผสมพันธุ์สีน้ำตาลแดงจะปรากฏบริเวณหัวและข้างคอ ในมหาวิทยาลัยจะพบตามแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ บึงธรรมชาติ ลอยน้ำอยู่ร่วมกับเป็ดแดง พบจำนวนน้อย 3-4 ตัว มีพฤติกรรมมุดน้ำ และโผล่ขึ้นผิวน้ำเป็นระยะ ๆ หาพบได้ยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

นกยางไฟธรรมดา



ชื่อสามัญ

Cinnamon Bittern

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Ixobrychus
cinnamomeus*

ชื่อวงศ์

Ardeidae

ชื่ออันดับ

Pelecaniformes

นกยางไฟธรรมดา เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง ขนาดตั้งแต่ 38-41 ซม. นกเพศผู้ ขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ข้างคอมีขีดสีขาว ปากยาวตรงสีเหลือง เพศเมียหลังและลำตัวมีลายจุดจากขอบขนสีน้ำตาลอ่อน กินแมลงที่อาศัยอยู่ตามพืชลอยน้ำเป็นอาหาร เช่น แผลงปอ ผีเสื้อ ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอน นอกจากนี้ยังกินปลาและสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ เช่น กบ หอย และปู เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยจะพบบริเวณพงหญ้ารกทึบ ใกล้อ่างเก็บน้ำ มักพบบริเวณที่มีพืชน้ำขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น โดยนกมีพฤติกรรมเดินจ้องหาเหยื่อ

เมื่อเห็นว่ามีสิ่งรบกวนจะรีบบินหนีทันที จากการสำรวจพบหากินอยู่ตามลำพัง และหาพบยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกยางกรอกพันธุ์จีน

ชื่อสามัญ

Chinese Pond Heron

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardeola bacchus

ชื่อวงศ์

Ardeidae

ชื่ออันดับ

Pelecaniformes



นกยางกรอกพันธุ์จีน เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 45-52 ซม. ถูผสมพันธุ์ ปากยาว ปากเหลืองสดปลายปากมีสีดำ หัว คอ ไปจนถึงอก มีสีน้ำตาลแดงแกมเลือดหมู นกนอกฤดูผสมพันธุ์ อกมีสีน้ำตาลเหลือง มีลายขีดยาวลงไปถึงท้อง ซึ่งชุดขนในฤดูผสมพันธุ์สีสวยสดใสกว่า ชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ กินแมลง และสัตว์น้ำ เป็นอาหาร มีพฤติกรรมยืนนิ่ง หรือเดินอย่างช้าๆ บนพืชลอยน้ำหรือลุยน้ำตื้นเพื่อจ้องจับเหยื่อ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว

โดยพบขณะเดินจ้องหาเหยื่อตามจุดที่มีน้ำขัง ริมขอบอ่างเก็บน้ำในช่วงเย็น ส่วนใหญ่พบเดินหากิน ตามลำพังเพียงตัวเดียว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระสาขาว



ชื่อสามัญ

Grey Heron

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardea cinerea

ชื่อวงศ์

Ardeidae

ชื่ออันดับ

Pelecaniformes

นกกระสาขาว เป็นนกขนาดใหญ่มาก ขนาด 90-100 ซม. ตาเหลือง ส่วนหัวมีสีดำคาดจากหัวตาไปท้ายทอย และลากยาวเป็นเส้นสองเส้นไปทางด้านหลังในตัวเต็มวัย ปากเหลือง มีขนลำตัวสีเทา คอและขาขาว กินหนอน แมลง สัตว์น้ำ และสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร พฤติกรรมการหากินคล้ายกับกลุ่มนกยาง คือ ยืนจ้องและเดินช้า ๆ เพื่อรอตกจับเหยื่อที่เป็นอาหารในบริเวณน้ำตื้น หรือเกาะนิ่งตามกิ่งไม้แห้งเพื่อจับปลา ในมหาวิทยาลัยพบยากโดยพบเพียงครั้งเดียว

ขณะยืนจ้องเหยื่ออยู่บนต้นไม้แห้งในบริเวณอ่างเก็บน้ำช่วงเช้าตรู่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกยางโทนน้อย

ชื่อสามัญ

Intermediate Egret

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardea intermedia

ชื่อวงศ์

Ardeidae

ชื่ออันดับ

Pelecaniformes



นกยางโทนน้อย เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ ขนาดตัวตั้งแต่ 65-72 ซม. ขนลำตัวสีขาว มีความคล้ายคลึงกับนกยางโทนใหญ่ แต่ตัวมีขนาดเล็กกว่า (นกยางโทนใหญ่ ขนาด 85-102 ซม.) ปากและผิวหนังบริเวณหน้าสีเหลือง ปลายปากดำเล็กน้อย ขา แข็ง และตีนสีดำ เดินหากินตามพืชลอยน้ำ ส่วนใหญ่เดินลุยน้ำที่ไม่ลึกมาก จ้องหาเหยื่อหรือเดินย่องช้า ๆ ตามโคลน กินสัตว์น้ำต่าง ๆ พบกินแมลงบ้าง แต่กินปลาเป็นอาหารหลัก ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเดินจ้องหาอาหาร

ตามดินโคลนริมอ่างเก็บน้ำในตอนกลางวัน อยู่โดดเดี่ยว บ่อยครั้งพบเดินหากินอยู่ใกล้กับนกยางกรอกพันธุ์จีน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกยางเปี่ย



ชื่อสามัญ
Little Egret
ชื่อวิทยาศาสตร์
Egretta garzetta
ชื่อวงศ์
Ardeidae
ชื่ออันดับ
Pelecaniformes

นกยางเปี่ย เป็นนกขนาดกลาง มีขนาด 55-65 ซม. ปากยาวและตรง ปากและขาสีดำ ตีนเหลือง ขนลำตัวสีขาว ในฤดูผสมพันธุ์มีขนสีขาว 2 เส้น คล้ายเปี่ยบริเวณท้ายทอย อาหารที่กินส่วนใหญ่ คือ ปลา นอกจากนี้ยังกินสัตว์น้ำอื่น ๆ เช่น กบ เขียด กุ้ง และแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบย่นึงจ้องเหยื่อตามริมน้ำที่มีหญ้าไม่สูงมาก พบบริเวณลำห้วยขนาดเล็ก นอกจากนี้พบเดินตามฟิซลอยน้ำที่ลอยติดกันอย่างหนาแน่นริมขอบอ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ
Oriental
Honey-buzzard
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pernis ptilorhynchus
ชื่อวงศ์
Accipitridae
ชื่ออันดับ
Accipitriformes



เหยี่ยวผึ้ง เป็นนกขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ขนาดตั้งแต่ 55-65 ซม. สีและลวดลายมีความหลากหลาย (polymorphism) ปากเรียวแหลม หัวเล็ก เป็นเหยี่ยวที่มีความเชื่องช้า ลำผึ้ง น้ำผึ้ง ต่อ แตน และตัวอ่อนของแมลงดังกล่าว บางครั้ง พบล่าสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกขนาดเล็ก และงู กินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะบินร่อนเหนือยอดตออยู่แฉ่งในเวลากลางวัน ก่อนร่อนไปเกาะตามกิ่งไม้ ปกติพบร่อนอยู่เดี่ยว ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

เหยี่ยวรุ้ง



ชื่อสามัญ
Crested Serpent Eagle
ชื่อวิทยาศาสตร์
Spilornis cheela
ชื่อวงศ์
Accipitridae
ชื่ออันดับ
Accipitriformes

เหยี่ยวรุ้ง เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ มีขนาดตั้งแต่ 76-84 ซม. ลักษณะเด่น คือ หนังรอบตาและหนังคลุมจมูกมีสีเหลือง ปลายปากดำ มีหงอนสั้น ๆ บริเวณท้ายทอย ลำงู กิ่งก่า และสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมขนาดเล็ก บางครั้งกินกบ ปู และแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยพบบินร่อนเป็นวงกว้าง และส่งเสียงร้องแหลมดังเหนื่อยอดดอยแง่ม ในเวลากลางวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️


เหยี่ยวนกเขาหงอน

ชื่อสามัญ
Crested Goshawk

ชื่อวิทยาศาสตร์
Accipiter trivirgatus

ชื่อวงศ์
Accipitridae

ชื่ออันดับ
Accipitriformes



เหยี่ยวนกเขาหงอน เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 40-46 ซม. จะงอยปากหนา ปีกกว้างแต่สั้นมาก หางยาว หนึ่งตาและขนคลุมจมูกมีสีเหลือง บริเวณท้ายทอยมีหงอน ขนบนขนคลุมใต้หางสีขาวพองฟูออกมา ล่าอาหารได้หลากหลาย เช่น กระรอก กระแต นก หนู ค้างคาว และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพบขณะบินร้อนเหนือยอดไม้บริเวณบ้านพักรับรองตรงข้ามบ้านพักรับรองอธิการบดีในช่วงบ่ายที่มีแดดร้อนจัด โดยจะพบไม่บ่อยนัก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

เหยี่ยวนกเขาชिकรา



ชื่อสามัญ

Shikra

ชื่อวิทยาศาสตร์

Accipiter badius

ชื่อวงศ์

Accipitridae

ชื่ออันดับ

Accipitriformes

เป็นนกขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 30-36 ซม. หัวและลำตัวด้านบนสีเทาจาก คอขาว มีเส้นกลางคอ กระหม่อมมน เพศเมียขนาดใหญ่กว่า เพศผู้ ล่าขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานจำพวก กิ้งก่ากินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะร่อนเหนือยอดไม้ จากการสำรวจพบ กระจายทั่วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ป่าธรรมชาติ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Rufous-winged
Buzzard

ชื่อวิทยาศาสตร์


Butastur liventer

ชื่อวงศ์

Accipitridae

ชื่ออันดับ

Accipitriformes



เหยี่ยวปีกแดง เป็นนักษณาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 38-43 ซม. เป็นเหยี่ยวปีกแตก ปีกแคบและยาวหางยาว ปลายตัด หนึ่งคลุมจมูกสีเหลือง ส่วนหัวและลำตัวมีสีเทา ล่านกขนาดเล็ก หนุณา กิ่งก่า งู กบ ปูนา และแมลงกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะเกาะอยู่ตามสายไฟ และกิ่งไม้แห่งบนต้นไม้จากการสำรวจปกติพบเกาะอยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียวและพบไม่บ่อย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก



ชื่อสามัญ

Common Buzzard

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buteo buteo

ชื่อวงศ์

Accipitridae

ชื่ออันดับ

Accipitriformes

เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก เป็นนกขนาดกลาง ขนาด 51-57 ซม. แต่เป็นกลุ่มเหยี่ยวปีกแตกขนาดใหญ่ มีชุดขนสีน้ำตาล ปีกสั้นแต่กว้าง หัวใหญ่ หางสั้น ลำตัวย่อกลุ่มหนูนาน สัตว์เลื้อยคลาน นกขนาดเล็ก กบ และแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พบยาก โดยพบร่อนผ่านเหนือยอดไม้ มีกิจกรรมและหากินในเวลากลางวัน พบเพียงครั้งเดียว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ
White-breasted
Waterhen

ชื่อวิทยาศาสตร์
Amauornis phoenicurus

ชื่อวงศ์
Rallidae

ชื่ออันดับ
Gruiformes



นกกวัก เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดประมาณ 28-36 ซม. ปากเล็กตรงสีเหลือง โคนปากบนและล่าง มีสีแดง หน้าขาว ออกและท้องสีขาวตัดกับขนหลัง สีเขียวเข้มไปจนเกือบดำ หางสั้น ขณะเดินกระดกหาง เป็นจังหวะ เป็นนกที่ปรับตัวเก่ง อยู่ได้ในหลายพื้นที่ เสียงร้อง “ก๊วก ก๊วก” จึงเป็นที่มาของชื่อ เดินหาอาหารตามริมน้ำ บนพืชลอยน้ำหรือบนพื้นดิน กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก แมลง และต้นอ่อนของพืชน้ำ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยมักจะ

เดินหากินในพงหญ้าเตี้ย ๆ ใกล้แหล่งน้ำ กระจายทั่ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนวณพบเป็นประจำ ในช่วงเช้าและเย็น เมื่อมีภัยหรือสิ่งรบกวนจะบินหนี หรือมุดเข้าพงหญ้าที่รกทึบทันที

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกอัญชันหางดำ



ชื่อสามัญ

Black-tailed Crike

ชื่อวิทยาศาสตร์

Porzana bicolor

ชื่อวงศ์

Rallidae

ชื่ออันดับ

Gruiformes

นกอัญชันหางดำ เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด 21-24 ซม. ปากสีเขียวยาวและตรง ตั้งแต่ส่วนหัวลงมา ถึงลำตัวด้านล่างสีเทาเข้ม ลำตัวด้านบนของนก มีสีน้ำตาลแดง กินเมล็ดพืช น้ำ หนอน แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็กบนพืชลอยน้ำเป็นอาหาร มีพฤติกรรมกระดกหางคล้ายนกกวัก เมื่อมีภัยจะเดิน มุดหนีไปอย่างรวดเร็ว ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยพบเพียงครั้งเดียวในช่วงเย็น ขณะเดินหา กิน บนพืชลอยน้ำริมอ่างเก็บน้ำก่อนจะตกใจบินหนี เข้าไปริมอ่างเก็บน้ำอีกฝั่ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	EN	-	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกอัญชันคิ้วขาว

ชื่อสามัญ

White-browed Crake

ชื่อวิทยาศาสตร์

Porzana cinerea

ชื่อวงศ์

Rallidae

ชื่ออันดับ

Gruiformes



นกอัญชันคิ้วขาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 19-23 ซม. ปากเหลือง ส่วนโคนปากมีสีแดง ตาแดง แสบตาดำ ลักษณะเด่น คือ บริเวณมุมปากและข้างแก้มมีสีขาว แสบขาวคล้ายคิ้วปรากฏบริเวณหัวตา กินยอดอ่อนของพืชน้ำ เมล็ดหญ้า แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยสำรวจพบขณะเดินหาकिनบนพีชลอยน้ำ ใกล้กับฝูงเป็ดแดง เมื่อรู้สึกปลอดภัย ไม่มีสิ่งรบกวน นกจะเดินหาकिनอย่างช้า ๆ มีพฤติกรรมกระดกหาง ขึ้นลงเป็นจังหวะขณะเดินหาकिन

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกอีล้ำ



ชื่อสามัญ

Common Moorhen

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gallinula chloropus

ชื่อวงศ์

Rallidae

ชื่ออันดับ

Gruiformes

นกอีล้ำ เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดประมาณ 30-35 ซม. ปากมีสีแดงแหลมและตรง ส่วนปลายปากเหลือ โค่นสันปากบนมีลักษณะเป็นกระบังสีแดง ขนปกคลุมลำตัวดำ ข้างลำตัวมีขีดขาวเป็นเส้น กินพืชน้ำต่าง ๆ เช่น สาหร่าย กก จอกแหน และสัตว์น้ำขนาดเล็ก จำพวกกุ้ง แมลงหนอน ปลอกน้ำ หอย ปู และปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะว่ายน้ำหากินในอ่างเก็บน้ำ หากินร่วมกับเป็ดผีเล็กในตอนกลางวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Barred Buttonquail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Turnix suscitator

ชื่อวงศ์

Turnicidae

ชื่ออันดับ

Charadriiformes



นกคุ่มอกลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 15-17.5 ซม. ลำตัวอ้วนป้อม ปากและขาสีเทา เพศผู้ และเพศเมียมีลักษณะแตกต่างกัน โดยนกเพศเมียขนาดใหญ่กว่าและมีสีสดใสนอกจากนี้คอและอกในนกเพศเมียมีสีดำ ซึ่งลักษณะนี้ไม่พบในนกเพศผู้ จะเห็นได้ว่าลักษณะเพศเมียมีความโดดเด่นกว่า จึงเป็นสาเหตุให้นกเพศผู้ต้องกกไข่และเลี้ยงดูลูกนก กินเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ หนอน และแมลงตามพื้นหญ้าเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย

พบไม่บ่อย โดยสำรวจพบขณะเดินทางกินบนถนน หากินอยู่เป็นคู่ในช่วงเย็น ไม่ค่อยระแวงระวังภัย เดินหลบเข้าข้างทางที่มีพุ่มหญ้าช้า ๆ เมื่อเดินสำรวจเข้าไปใกล้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	☀	☀/☀	☀	☀	☀/☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

นกชายเลนน้ำจืด



ชื่อสามัญ
Wood Sandpiper
ชื่อวิทยาศาสตร์
Tringa glareola
ชื่อวงศ์
Scolopacidae
ชื่ออันดับ
Charadriiformes

นกชายเลนน้ำจืด เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 18-21 ซม. ปากเล็กตรงเรียวแหลม สีเทาดำ คีวสีขาวลากยาวชัดเจน อกด้านบนสีเทาขาว มีลายขีดสีน้ำตาล ท้องสีขาว มีพฤติกรรมใช้ปากขอนไชโคลนเพื่อหาอาหารที่เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็ก เดินไล่จิก กุ้ง หอย ปู ปลา และแมลงกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะเดินหาอาหารตามดินโคลนข้างอ่างเก็บน้ำ เดินหากินและใช้ปากขอนไชตามโคลนรอบบริเวณที่น้ำลด ในช่วงเย็น พบหากินใกล้กับนกเด้าดิน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Rock Pigeon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Columba livia

ชื่อวงศ์

Columbidae

ชื่ออันดับ

Columbiformes



นกพิราบ เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดตั้งแต่ 33-34 ซม. หัวมีสีเทา หลังและอกเป็นสีเทาเข้มกว่า ปีกเทาอ่อนมีแถบปีกดำเห็นชัดเจน ขาและนิ้วสีแดง เป็นนกที่มีความหลากหลายของรูปแบบของสีลำตัวปรับตัวเก่ง อาศัยอยู่ได้ทั้งขอบป่าใกล้ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และในเมือง เป็นนกที่หากินตามพื้น กินอาหารได้หลากหลาย ทั้งเมล็ดพืช ผลไม้ และยอดอ่อนของพืช ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย

โดยมักจะเกาะตามสายไฟ พบเดินหากินบนพื้นหญ้า กับนกกระจอกบ้าน นกเอี้ยงสาริกา และนกเอี้ยงหงอน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

นกเขาไฟ



ชื่อสามัญ

Red Collared Dove

ชื่อวิทยาศาสตร์

Streptopelia tranquebarica

ชื่อวงศ์

Columbidae

ชื่ออันดับ

Columbiformes

นกเขาไฟ เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด 23-24.5 ซม. คอสั้น ปีกยาวแหลม หัวและคอหอยของเพศผู้มีสีเทา ขนลำตัวสีน้ำตาลแดง เพศเมียขนลำตัวสีน้ำตาล ทั้งสองเพศมีแถบดำคาดบริเวณท้ายทอย ส่วนนกวัยเด็ก คล้ายเพศเมียคือไม่มีแถบคาดที่คอ กินเมล็ดพืช และ ธัญพืชต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย ส่วนใหญ่สำรวจพบอยู่เป็นคู่ เกาะตามสายไฟ กิ่งไม้แห้ง และเดินจิกตามพื้นหญ้า พบบ่อยบริเวณ เปิดโล่งที่มีหญ้าเตี้ย ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง

ชื่อสามัญ

Eastern Spotted Dove

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spilopelia chinensis

ชื่อวงศ์

Columbidae

ชื่ออันดับ

Columbiformes



นกเขาใหญ่หรือนกเขาหลวง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 30-31 ซม. หัวเทา ส่วนคอ ลงไปถึงท้องมีสีน้ำตาลอ่อน คอสั้น คอด้านบน เป็นแถบดำมีลายจุดสีขาว ขาและนิ้วสีแดง หางยาว กินเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หนอนและแมลงชนิดต่าง ๆ ตามพื้นดินและพื้นถนน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยมักจะเกาะสายไฟข้างถนนเป็นคู่ หรือมากกว่า 2 ตัว ในช่วงที่ผลร่วงและลูกไทรริมถนนสุก พบหากินอยู่ตามเรือนยอดรอบนอก มีตำแหน่ง ในการหากินแตกต่างกันกับนกกินผลไม้ชนิดอื่น

ที่เข้ามาหากินพร้อมกันบนต้นเดียวกัน นอกจากนี้ พบเดินจิกกินตามพื้นหญ้าและถนน และเกาะตาม กิ่งไม้สำรวจพบตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

นกเขาเขียว



ชื่อสามัญ

Common Emerald Dove

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chalcophaps indica

ชื่อวงศ์

Columbidae

ชื่ออันดับ

Columbiformes

นกเขาเขียว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 23-27 ซม. ปากมีสีแดงสด ลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลแกมม่วง ตะโพกสีขาวมีขีดดำตรงกลาง เพศผู้หน้าผากและคิ้วมีสีขาว ส่วนกระหม่อมและท้ายทอยออกสีเทาแกมน้ำเงิน เพศเมียท้ายทอยมีสีน้ำตาล กินเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช และผลของไม้ให้ผลที่หล่นตามพื้น พบกินแมลงในบางโอกาส ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะบินตามช่องขนาดเล็กในป่าบินเร็ว แต่บินไม่สูงมากนัก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Zebra Dove

ชื่อวิทยาศาสตร์

Geopelia striata

ชื่อวงศ์

Columbidae

ชื่ออันดับ

Columbiformes



นกเขาชวา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด 21-21.5 ซม. ลำตัวและหางเรียวยาว กระหม่อมตอนหน้าสีเทา มีลายขวางจากคอ หลัง ไปจนถึงด้านข้างลำตัว หน้าและข้างคอของเพศผู้มีสีเทา ส่วนของเพศเมีย มีสีน้ำตาล จิกกินเมล็ดหญ้า และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ ตามพื้นดินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะสำรวจเจออยู่เป็นคู่ขณะเดินจิกกินเมล็ดหญ้า สำรวจพบตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

นกกระปูดใหญ่



ชื่อสามัญ
Greater Coucal
ชื่อวิทยาศาสตร์
Centropus sinensis
ชื่อวงศ์
Cuculidae
ชื่ออันดับ
Cuculiformes

นกกระปูดใหญ่ เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 50-53 ซม. ในนกเต็มวัย สีของหัว คอ ลำตัว ไปจนถึงหางมีสีดำเหลือบม่วง ปากหนา ขาและนิ้วแข็งแรงมาก หลังและปีกสีน้ำตาลแดง ตาสีแดง ส่วนในนกวัยเด็ก ตาสีเทา เนื่องจากมีปากและนิ้วที่แข็งแรงจึงล่าสัตว์ได้หลากหลายชนิด ทั้งกิ้งก่า งู กบ เขียด ปลา และนกขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยพบตามพื้นที่โล่งข้างทาง เกาะตามพงหญ้ารกทึบ พบอยู่โดดเดี่ยว เดินจิกกินซากสัตว์ที่ถูกรถชนตาย บนถนนค่อนข้างบ่อย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกระปูดเล็ก

ชื่อสามัญ
Lesser Coucal

ชื่อวิทยาศาสตร์
*Centropus
bengalensis*

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes



นกกระปูดเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดประมาณ 36-38 ซม. ปากหนา หางยาว นกตัวเต็มวัย หัว ลำตัวและหลังมีสีดำ ปีกสีน้ำตาลแดง มีลายขีดสีน้ำตาลอ่อนกระจายอยู่บริเวณหลังคอไปถึงหลัง ก้นแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด งู และ กิ้งก่า เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบเกาะนั่งตามกิ่งไม้แห้งในพงหญ้าที่บช่วงเช้าตรู่ มีพฤติกรรมค่อนข้างนิ่งและชอบหลบอยู่ตามที่รก จึงพบเห็นตัวได้ยากกว่านกกระปูดใหญ่ โดยจะพบไม่บ่อย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกบั้งรอกใหญ่



ชื่อสามัญ

Green-billed Malkoha

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phaenicophaeus tristis

ชื่อวงศ์

Cuculidae

ชื่ออันดับ

Cuculiformes

นกบั้งรอกใหญ่ เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดประมาณ 53-59 ซม. ปากสีเขียวอ่อน หนังรอบตา มีสีแดง หัว ลำคอ และอกสีเทาจาง ปีก หลังและหางสีน้ำตาลเหลือบเขียว หางยาวมาก (37-38 ซม.) ปลายหางขาว กินแมลง หนอน สัตว์เลื้อยคลานด้วยนมขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร เช่น ตั๊กแตน จักจั่น และกิ้งก่า เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย จะพบบ่อย โดยพบกระโดดหากินตามเรือนยอดไม้

ที่มีใบหนาแน่น ปกติพบเห็นเพียงลำพังเพียงตัวเดียว ส่วนใหญ่สำรวจพบเนื่องจากนกบินจากเรือนยอดไม้หนึ่งไปเกาะอีกต้น สังเกตพบเห็นตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	☀	☀/☀	☀	☀	☀/☁	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

ชื่อสามัญ
Asian Koel

ชื่อวิทยาศาสตร์
Eudynamis scolopaceus

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes



นกกาเหว่า เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดประมาณ 40-44 ซม. ปากสีเขียวยาว ตาแดง หางยาวเป็นบั้ง ปีกสั้น ปลายปีกมน เพศผู้ หัวลำตัวไปจนถึงหางมีสีดำเหลือบน้ำเงิน เป็นมัน ส่วนเพศเมียขนลำตัวสีน้ำตาล มีลายจุดสีน้ำตาลอ่อน และขาวกระจายทั่วตัว นกเพศผู้ส่งเสียงร้องดัง “โก-เอว” หรือ “กา-เว้า” ในช่วงเช้าและเย็น กินผลไม้ที่มีเปลือกอ่อนและแข็ง มีรายงานกินไข่ของ นกขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย

โดยจะหากินร่วมกันกับนกกินผลไม้หลายชนิด บนต้นกร่างและไทร ปกติพบเห็นอยู่เพียงลำพัง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกคัคคูมรกต



ชื่อสามัญ

Asian Emerald Cuckoo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysococcyx maculatus

ชื่อวงศ์

Cuculidae

ชื่ออันดับ

Cuculiformes

นกคัคคูมรกต เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 17-18 ซม. ปากเหลืองสั้นโค้งเล็กน้อย ปลายปากสีดำ ในเพศผู้ หัว คอ และบริเวณลำตัวด้านบนสีเขียวสด ส่วนเพศเมีย หัวสีน้ำตาลแดง ขนลำตัวด้านบนสีออกเขียวมรกต ลำตัวด้านล่างทั้งสองเพศเป็นลายขวาง สีเขียวแกมทองแดง กินแมลงเป็นอาหาร เช่น ตัวหนอน มวน แมลงที่มีลำตัวอ่อน และมด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยเกาะบนกิ่งไม้ข้างถนน

ขณะกำลังกินตัวหนอนมีพฤติกรรมฟาดตัวหนอนให้ตาย ก่อนกิน เนื่องจากนกคัคคูมรกตเป็นนกขนาดเล็ก และมีสีสันทกมกลืนกับใบไม้ ประกอบกับเป็นนกที่มีปริมาณไม่มากนัก จึงพบเห็นตัวได้ยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ
Violet Cuckoo

ชื่อวิทยาศาสตร์
*Chrysococcyx
xanthorhynchus*

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes



นกคัคคูสีม่วงเป็นนกขนาดเล็กมีขนาด 16-17 ซม. นกเพศผู้ ส่วนของหัว คอ และลำตัวมีสีม่วงเหลือบเป็นมัน เพศเมีย หน้าผากและหลังมีสีน้ำตาลแกมเหลือง ทั้งสองเพศมีลายขวางด้านล่างลำตัว และส่วนของอก ใบหน้า ในเพศเมีย กินแมลง กินได้ทั้งหนอนที่มีขนและไม่มีขนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย เนื่องจากมีปริมาณไม่มากนักเช่นเดียวกับนกคัคคูมรกต โดยจะพบเกาะบนต้นไม้หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย

ขณะกำลังจิกกินตัวบุงที่เกาะติดกันเป็นแนวยาวบนกิ่งไม้ นอกจากนี้พบกระโดดไปมาในพุ่มไม้สูง เพื่อดักจับแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกคัคคูลาย



ชื่อสามัญ
Banded Bay Cuckoo
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cacomantis sonneratii
ชื่อวงศ์
Cuculidae
ชื่ออันดับ
Cuculiformes

นกคัคคูลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 22-23 ซม. ปากยาวแหลม คอเล็กน้อย กระหม่อมยาวไปถึงท้ายทอย ลำตัวด้านบนและหางมีสีน้ำตาลแถบตาสีเข้ม ลำตัวส่วนบนและหางมีลายขีดสีดำ ปลายหางขาวมีลักษณะคล้ายคลึงกับนกอีวาบตักแต่นมีเสียงร้อง “ปี้-ปี้-ป้าว-ป้าว” แหลม เกะเยดไม่ส่งเสียงร้องในที่โล่ง กินหนอนและแมลงต่างๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะพบเกาะกิ่งไม้อยู่โดดเดี่ยวในช่วงเย็นค่ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกอีวาบตักแตน

ชื่อสามัญ

Plaintive Cuckoo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cacomantis merulinus

ชื่อวงศ์

Cuculidae

ชื่ออันดับ

Cuculiformes



นกอีวาบตักแตน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 22-23 ซม. นกตัวเต็มวัยเพศผู้ คอและอกมีสีเทา หลังและปีกสีเทาแกมน้ำตาลเข้ม ท้องไปจนถึงก้นสีน้ำตาลแดง เพศเมียมีชุดขน 2 แบบ คือ สีน้ำตาลและเทา แบบแรกคล้ายนกคัคคูลายแบบที่สองคล้ายเพศผู้ กินหนอนและแมลงชนิดต่างๆ ตั้งแต่ตามพื้นดิน ในพุ่มไม้ไปจนถึงตามเรือนยอด ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงก่อนจึงสำรวจเห็นตัวนก พบเกาะและส่งเสียงร้อง

อยู่บนกิ่งไม้ข้างถนน ได้ยินเสียงร้องค่อนข้างบ่อยในตอนเย็น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	NT	LC												

นกคัคคูแซงแซว



ชื่อสามัญ

Square-tailed Drongo
Cuckoo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Surniculus lugubris

ชื่อวงศ์

Cuculidae

ชื่ออันดับ

Cuculiformes

นกคัคคูแซงแซว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 24-25 ซม. ปากเรียวแหลม โคนงเล็กน้อย ตาสีแดง ขนทั่วตัวสีดำเป็นมัน ท้ายทอยและต้นขามีแถบขาว ขนาดเล็ก หางมีแถบขวางสีขาวกระจาย จิกกินหนอน

ตามต้นไม้ และบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ ก่อนบินกลับมาเกาะนิ่งบนกิ่งไม้ข้างถนนในกิ่งเดิมหรือกิ่งใกล้ ๆ ตำแหน่งเดิม



บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกฮูก, นกเค้ากู่

ชื่อสามัญ

Collared Scops Owl

ชื่อวิทยาศาสตร์

Otus lettia

ชื่อวงศ์

Strigidae

ชื่ออันดับ

Strigiformes



นกฮูก หรือนกเค้ากู่ เป็นนกกลางคืนขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 22-23 ซม. ตากลม สีน้ำตาลแดง บางตัวเป็นสีเหลือง จะงอยปากสีเทา ขนลำตัว มีสีน้ำตาลแกมสีเนื้อ หรือน้ำตาลแกมเทา หน้าผาก คิ้วและรอบคอมีแถบสีขาวแกมน้ำตาล กินแมลง เช่น ตัวด้วง ตั๊กแตน แต่ส่วนใหญ่กินสัตว์มีกระดูกสันหลัง ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น กิ้งก่า หนู นก โดยใช้กรงเล็บที่แข็งแรงจับแล้วกลืนกินทั้งตัว เนื่องจากมีกระเพาะพัก ส่วนที่ไม่ถูกย่อย จะถูกสำรอกออกมา ในมหาวิทยาลัยพบเห็นบ่อย

โดยได้ยินเสียงเป็นประจำทุกเดือนบริเวณต้นไม้ริมถนนใกล้บ้านพักรับรองอธิการบดี พบหลบนอนในพุ่มไม้สูงประมาณ 3 เมตร ส่วนใหญ่พบเกาะตามเสาใกล้ริมถนนในขณะขับรถสำรวจในเวลากลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	NT	LC												

นกเค้าหุยาาเล็ก



ชื่อสามัญ
Oriental Scops Owl
ชื่อวิทยาศาสตร์
Otus sunia
ชื่อวงศ์
Strigidae
ชื่ออันดับ
Strigiformes

นกเค้าหุยาาเล็ก เป็นนกกลางคืนขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19 ซม. ตัวเล็ก ตาสีเหลือง จงอยปากสีดำ มีชุดขนสีน้ำตาลและชุดขนสีเทา ลำตัวด้านล่างมีลายจุดเด่นชัด กินด้วงปีกแข็ง และแมลงชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจับหนู กิ้งก่า และนกกินเป็นอาหาร ตอนกลางวันหลบซ่อนตัวตามพุ่มไม้ โพรงไม้ หรือตามกิ่งที่สามารถอำพรางตัวได้ ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยสำรวจพบบริเวณทางขึ้นดอยแง่ม เกาะนอนบนกิ่งไม้ในพงหญ้า 4 ตัว ในช่วงเช้าตรู่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกเค้าโมง, นกเค้าแมว

ชื่อสามัญ

Asian Barred Owlet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glaucidium

cuculoides

ช่อวงศ์

Strigidae

ข้ออันดับ

Strigiformes



นกเค้าโมง หรือนกเค้าแมว เป็นนกกลางคืนขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 22-23 ซม. หัวและลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาล คีวขาว ตากลมสีเหลือง คอหอยสีขาว ออกมีลายสีน้ำตาลเข้มตามแนวขวาง ส่วนที่เหลือด้านล่างเป็นลายสีน้ำตาลสลับขาว มีตาหลอกอยู่ด้านหลังของหัว กินแมลง เช่น ตัวงักแข็ง จักจั่น สัตว์เลื้อยคลานด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลาน เช่น หนู และกิ้งก่า ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยมักพบเกาะนั่งบนต้นไม้หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย ในตอนเช้าจะส่งเสียงร้องเป็นประจำบริเวณต้นไม้ริมถนนบ้านพักรับรองอธิการบดี



บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกตบยุงหางยาว



ชื่อสามัญ

Large-tailed Nightjar

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Caprimulgus
macrurus*

ชื่อวงศ์

Caprimulgidae

ชื่ออันดับ

Caprimulgiformes

นกตบยุงหางยาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 31.5-33 ซม. ขณะเกาะปลายหางยาวเลยปลายปีก ออกมามากกว่านกตบยุงชนิดอื่น มีแถบขาว 4 แถบเด่นชัดบริเวณปลายปีก กลางวันนอนหมอบหลบตามพื้นดิน พุ่มไม้ที่มีเศษใบไม้ทับถม ออกหากินในช่วงหัวค่ำยาวไปตลอดกลางคืน กินแมลงกลางคืน เช่น ผีเสื้อกลางคืน ตัวงูปีกแข็งต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยสำรวจพบขณะเกาะเสาหลักกิโลข้างถนนขณะส่องไฟสำรวจในตอนกลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	❄️	❄️

นกแอ่นฟ้าหงอน

ชื่อสามัญ

Crested Treeswift

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiprocne coronate

ชื่อวงศ์

Hemiprocniidae

ชื่ออันดับ

Caprimulgiformes



นกแอ่นฟ้าหงอน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 22-23 ซม. ลำตัวมีสีเทา เฉพาะปีกและหางมีสีเทาเข้ม เป็นมัน ท้องด้านล่างสีขาว หน้าผากมีหงอนยาวตั้งขึ้น ขณะบินทางแหลม นกเพศผู้ แก้มและขนบริเวณหูสีน้ำตาลแดง ส่วนเพศเมียเป็นสีเทาเข้ม บินโฉบ จับแมลงอันดับผึ้ง ต่อ แตน และด้วงปีกแข็ง กินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพายุกโดยสำรวจพบ เกาะบนกิ่งไม้แห้ง และบินร่อนโฉบแมลงกลางอากาศ ในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกแอ่นตาล



ชื่อสามัญ

Asian Palm Swift

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypsiurus balasiensis

ชื่อวงศ์

Apodidae

ชื่ออันดับ

Caprimulgiformes

นกแอ่นตาล เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด 12-13 ซม. ตัวเล็ก ผอมเพรียว ปีกและหางเรียวยาว ลำตัวสีน้ำตาลเข้มทั้งตัว หางเว้าลึกมองเห็นเป็นแฉกขณะบิน ใช้เวลาส่วนใหญ่บินและร่อนกลางอากาศ ในตอนกลางวัน กินแมลงกลางอากาศ ทั้งอันดับผึ้ง ต่อ แตน อันดับมวน และด้วงปีกแข็ง ในมหาวิทยาลัย พบบ่อย โดยจะบินโฉบแมลงกลางอากาศเป็นกลุ่มใหญ่หลายสิบตัว และพบเห็นได้ตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

ชื่อสามัญ
House Swift

ชื่อวิทยาศาสตร์
Apus nipalensis

ชื่อวงศ์
Apodidae

ชื่ออันดับ
Caprimulgiformes



นกแอ่นบ้าน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 15 ซม. ลำตัวสีดำ คอหอยและบริเวณตะโพกมีสีขาวชัดเจน หางเว้าเล็กน้อยขณะแผ่หางเลี้ยวแข็งแรง ใช้เวลาบินและร่อนตลอดทั้งวัน กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร โดยเฉพาะแมลง ในอันดับแมลงวัน อันดับมวน ตัวงีบปีกแข็ง และอันดับผึ้ง ต่อ แตน ปากกว้าง บินโฉบจับแมลงและกลืนทันที ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะบินและร่อนกลางอากาศในตอนกลางวัน แต่ในตอนกลางคืนเกาะนอนในท่อน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกะเต็นอกขาว



ชื่อสามัญ

White-throated
Kingfisher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halcyon smyrnensis

ชื่อวงศ์

Alcedinidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes

นกกะเต็นอกขาว เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 27-29.5 ซม. ปากสีแดง หนา ปลายปากแหลม ส่วนของหัว หลังส่วนบนและท้อง มีสีน้ำตาลเข้ม คอและอกมีสีขาว หลัง ปีก และหาง มีสีน้ำเงินสด กินสัตว์น้ำ ปลา กบ เขียด กิ้งก่า และ แมลงเป็นอาหาร หากเหยื่อมีขนาดใหญ่ จะใช้วิธี พาดกับกิ่งไม้ ร่อนเหยื่อตายค่อยกลืนกินทั้งตัว ขณะบินส่งเสียงร้อง “แก๊ก-แก๊ก-แก๊ก” กังวาน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยเกาะนิ่งเพื่อเฝ้าจับปลา บนต้นไม้แห้งกลางน้ำ หรือบนกิ่งไม้แห้งใกล้แหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	❄️	❄️

นกกะเต็นหัวดำ

ชื่อสามัญ

Black-capped
Kingfisher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Halcyon pileata

ชื่อวงศ์

Alcedinidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes



นกกะเต็นหัวดำ เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 29-31.5 ซม. ปากหนา ยาวแหลมมีสีแดงสด หัวสีดำ รอบคอมีสีขาว ไหล่มีสีดำ ปีกหลัง ลำตัวด้านหลังและหางมีสีน้ำเงินสด บินโฉบจับปลา ปู กบ ตามแหล่งน้ำ นอกจากนี้ยังกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและแมลงเป็นอาหาร มีพฤติกรรมการกิน คล้ายนกกะเต็นอกขาว ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะกิ่งไม้แห้งเพื่อรอจับเหยื่อบนต้นไม้ ใกล้แหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ


จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพผ่านในช่วงฤดูหนาว

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน



ชื่อสามัญ

Blue-eared Kingfisher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alcedo meninting

ชื่อวงศ์

Alcedinidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes

นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดตั้งแต่ 15.5-16.5 ซม. ปากยาวแหลมสีดำ ขนสีน้ำเงินเข้ม หลังและตะโพกสีน้ำเงินจาง ๆ ออกฟ้า คอหอยขาว ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลเข้ม ขนและนิ้วสีแดง พบอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ กินปลาและแมลงน้ำเป็นอาหารหลัก ใช้วิธีเกาะกิ่งไม้หรือเกาะตามโขดหินนิ่งเพื่อรอจับเหยื่อ ใช้ปากโฉบจับ ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อยนัก โดยสำรวจพบเกาะนิ่งตามพุ่มไม้เตี้ยตามขอบอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพบเกาะนิ่งตามโขดหิน

ริมสระน้ำเพื่อรอโฉบจับปลาในตอนเช้าตรู่ ช่วงที่ยังไม่มีคนพลุกพล่าน เมื่อตกใจจะบินหลบไปอีกฝั่งของสระน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกระเต็นน้อยธรรมดา

ชื่อสามัญ

Common Kingfisher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alcedo atthis

ชื่อวงศ์

Alcedinidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes



นกกระเต็นน้อยธรรมดา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด 16-18 ซม. ขนมีสีน้ำเงินเหลือขอบเขียว ขนบริเวณหัวมีสีน้ำตาลเหลืองต่อเนื่องกับแถบขาว คอหอยมีสีขาว ส่วนหลังและตะโพกมีสีฟ้าขาว ขณะบินจะส่งเสียงร้อง “จิ-จิ-จิ” แหลมกังวาน ทำให้พบเห็นตัวได้ง่าย กินปลาขนาดเล็ก ลูกอ๊อด กบ เขียด และแมลงน้ำ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยช่วงฤดูหนาว โดยพบเกาะนั่งบนต้นไม้แห้งขนาดเล็กริมสระน้ำ เพื่อรอดักโฉบจับปลาในตอนเช้าตรู่ พบเกาะอยู่โดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกจาบคาเคราน้ำเงิน



ชื่อสามัญ

Blue-bearded
Bee-eater

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nyctyornis athertoni

ชื่อวงศ์

Meropidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes

นกจาบคาเคราน้ำเงิน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาดตัวประมาณ 33-37 ซม. ปลายปากแหลม โคนเล็กน้อย ตาเหลือง ลำตัวโดยรวมสีเขียว หน้าผากสีฟ้าแกมเขียว บริเวณคอหอยยาวลงไปถึงอก มีสีน้ำเงินแกมฟ้าลักษณะคล้ายเครา ท้องเหลือง มีลายขีดสีเขียว อาหาร ได้แก่ กลุ่มของผึ้ง ต่อ แตน แมลงชนิดต่าง ๆ และกิ่งก้านขนาดเล็ก ใช้วิธีการบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ และกลับมาเกาะในตำแหน่งเดิมหรือกิ่งใกล้เคียง ๆ ส่วนของสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กใช้การฉีกกิน บางครั้ง

พบกินน้ำหวานจากดอกของไม้ต้นขณะออกดอก ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย สํารวจพบเกาะปลายกิ่งไม้บินโฉบจับแมลงก่อนบินกลับมาเกาะกิ่งเดิม

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Green Bee-eater

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merops orientalis

ชื่อวงศ์

Meropidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกจาบคาเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 20-23 ซม. เฉพาะขนหางคู่กลางยาว 10-11 ซม. ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีขนเหมือนกัน ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเขียว กระจงหน้าและคอด้านบนสีส้มออกแดง แถบคาดตาสีดำ ออกลายแถบสีเข้มและคอหอยสีน้ำเงินแกมเขียว ตัวไม่เต็มวัยลำตัวสีที่เข้มกว่า คอหอยสีเหลือง ขนหางคู่กลางไม่งอกยาวออกไปเหมือนตัวเต็มวัย อาหารของนกชนิดนี้ ได้แก่ แมลงชนิดต่าง ๆ มักมีพฤติกรรมบินโฉบจับกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัย

พบบ่อย โดยอาศัยและหากินตามทีโล่ง เช่น ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และบริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	☀	☀/☀	☀	☀	☀/☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀

นกจาบคาหัวสีส้ม



ชื่อสามัญ

Chestnut-headed
Bee-eater

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merops leschenaultia

ชื่อวงศ์

Meropidae

ชื่ออันดับ

Coraciiformes

นกจาบคาหัวสีส้ม เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัวตั้งแต่ 19-20 ซม. นกตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเขียว กระหม่อมและท้ายทอยลงไปถึงหลังมีสีส้ม แถบคาดาคอหอยมีสีน้ำเงินแกมเขียว ออกมีแถบครึ่งวงกลมสีดำทางคู่กลางแหลมยาวออกมา กินแมลงชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร เกาะนิ่งเพื่อดักรอแมลงก่อนบินโฉบจับกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยเกาะตามกิ่งไม้โลง ยอดไม้ในพื้นที่เปิดโล่ง บินว่อนไปมาริมถนน ส่วนใหญ่พบอยู่เป็นฝูง

น้อยครั้งพบอยู่ตามลำพัง ในช่วงที่นกทำรังในโพรงตามเนินดิน ไม่ควรเข้าไปรบกวน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	❄️	❄️

นกกระรางหัวขวาน

ชื่อสามัญ
Eurasian Hoopoe

ชื่อวิทยาศาสตร์
Upupa epops

ชื่อวงศ์
Upupidae

ชื่ออันดับ
Bucerotiformes



นกกระรางหัวขวาน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 29-30 ซม. ปากดำ มีลักษณะเรียวยาวและโค้ง หัวมีหงอนยาวสีน้ำตาลแดง ปลายหงอนมีสีดำ หงอนลู่และตั้งได้ ปีกและลำตัวมีลายสีดำสลับขาว หางดำ มีแถบขาวกั้นขวางตรงกลาง กินแมลง หนอน ตั๊กแตน ตัวอ่อนของแมลงจำพวก ปลวก มด ตั๊กแตน และจิ้งหรีด เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยสำรวจพบขณะเดินจิกแมลงกินตามพื้นหญ้า

บริเวณที่พบ


จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกโพระดกธรรมดา



ชื่อสามัญ

Lineated Barbet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psilopogon lineatus

ชื่อวงศ์

Megalaimidae

ชื่ออันดับ

Piciformes

นกโพระดกธรรมดา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 27-28 ซม. บริเวณหัว ออก ยาวลงไปถึงท้อง มีสีน้ำตาลแกมเหลือง มีลายเกล็ดสีน้ำตาลอ่อน ปากหนาสีเหลืองส้ม หนังรอบตาสีเหลือง ขนลำตัวและหางสีเขียว เสียงร้อง “โฮ-ปิก โฮ-ปิก” ดังกังวาน เป็นกลุ่มนกกินผลไม้ กินผลสุกของไม้กลุ่มไทร หว้า ตะขบ โดยใช้วิธีปลิดผลจากขั้ว ก่อนจะกลืนกิน แต่พบกินน้ำหวาน แมลง และสัตว์กลุ่มปาด และกิ้งก่า เป็นอาหาร นกกลุ่มนี้ถือเป็นตัวกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีอีกกลุ่ม เนื่องจากกินลูกไม้เป็นอาหารหลัก

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะกินลูกไทร กร่าง หากินร่วมกับนกกินผลไม้ชนิดอื่น มักพบเห็นกระโดดไปมาในระดับเรือนยอดและเกาะนิ่งเพื่อส่งเสียงร้องในช่วงเช้าและเย็น พบเห็นโดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกโพระดกหูเขียว

ชื่อสามัญ

Green-eared Barbet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psilopogon

faiostrictus

ชื่อวงศ์

Megalaimidae

ชื่ออันดับ

Piciformes



นกโพระดกหูเขียว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด 23-24 ซม. มีคล้ายคลึงกับนกโพระดกธรรมดา แต่ปากหนาสีดำ โคนปากเหลือง บริเวณแก้มและขนคลุมหูสีเขียว เป็นที่มาของชื่อไทย ด้านข้างคอมีแถบสีแดงขนาดเล็ก กินผลไม้เป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะผลของไทร หว้า ตะขบ และผลของไม้เถาบางชนิดในธรรมชาติ ส่วนอาหารประเภทอื่นคล้ายกับนกโพระดกธรรมดา ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย สำรวจพบขณะกระโดดไปมาบนเรือนยอดของต้นไม้ในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ


จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	❄️	❄️

นกโพระดกคอสีฟ้า



ชื่อสามัญ

Blue-throated Barbet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Psilopogon asiaticus

ชื่อวงศ์

Megalaimidae

ชื่ออันดับ

Piciformes

นกโพระดกคอสีฟ้า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัว 22-23 ซม. ใบหน้า คางและคอหอยมีสีฟ้า ส่วนของหน้าผากและกระหม่อมตอนท้ายสีแดง กลางกระหม่อมมีเส้นสีดำลากยาวลงมาด้านข้าง ทั้งสองด้าน แด้มสีแดงเล็กบริเวณคอหอย ลำตัวและหาง สีเขียว กินผลไม้กลุ่มเดียวกันกับนกโพระดกธรรมดา นอกจากนี้พบกินหนอนและแมลงบางช่วงเวลา ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย ส่วนใหญ่พบหากินเพียงลำพัง ปลิดกินผลของไม้กลุ่ม Macaranga และหวดปลาหมึกในช่วงที่ลูกไม้เต็มต้น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Coppersmith Barbet

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Psilopogon
haemacephalus*

ชื่อวงศ์

Megalaimidae

ชื่ออันดับ

Piciformes



นกตีทอง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัวประมาณ 16-17 ซม. เป็นนกที่เล็กที่สุดในกลุ่มนกโพระดกปากดำ หน้าผากสีแดง คิ้ว บริเวณใต้ตาและคอหอยสีเหลือง ด้านล่างคอหอยมีแถบแดง ออกลงไปถึงท้อง มีลายขีดสีเขียว ลำตัวเขียว กินอาหารกลุ่มเดียวกับนกโพระดกธรรมดา พบกินแมลงและจิกกินหนอนตามต้นไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะเกาะตามสายไฟ พบมากที่สุดเกาะเรียงกันมากกว่า 10 ตัวในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	☀	☀/☀	☀	☀	☀/☀	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

นกหัวขวานจิ้งจิวขาว



ชื่อสามัญ

White-browed Piculet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sasia ochracea

ชื่อวงศ์

Picidae

ชื่ออันดับ

Piciformes

นกหัวขวานจิ้งจิวขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตัวเพียง 8-9.5 ซม. ปากสั้นตรงสีเทา ปลายปากดำ หนึ่งรอบตาสีแดง หลังตามีคิ้วสั้น สีขาว ขนลำตัวด้านหลังสีเขียวแกมเหลือง ท้องสีส้ม แกมน้ำตาลแดง เพศผู้หน้าผากเหลือง ส่วนเพศเมีย หน้าผากสีน้ำตาล มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวไปมา ตลอดเวลา กินแมลง จำพวกมด ไช้มด หนอน เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย จะกระโดด ไปมาขณะหาอาหารตามกิ่งไม้แห้ง ต้นไม้ที่มีกิ่ง ขนาดเล็กและพุ่มเพื่อจิกกินหนอนและแมลง ที่หลบอยู่ตามกิ่ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกหัวขวานต่างแคะ

ชื่อสามัญ

Grey-capped Pygmy
Woodpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์

Yungipicus canicapillus

ชื่อวงศ์

Picidae

ชื่ออันดับ

Piciformes



นกหัวขวานต่างแคะ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13-15.5 ซม. ทั้งสองเพศหน้าผากและกระหม่อมมีสีเทา แต่ในเพศผู้ส่วนด้านข้างของหัวบริเวณแกว ๆ หางตาไปด้านหลังมีเส้นสีแดงเล็ก ๆ หลังสีดามีลายขาวขวาง ออกและท้องมีขีดลายสีดำ เป็นกลุ่มนกกินแมลง พฤติกรรมการหากินคล้ายนกไต่ไม้ จิกกินมด ปลวก หนอน และแมลงชนิดต่าง ๆ ตามเปลือกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะไต่ตามกิ่งไม้แห้งและลำต้นหลักของต้นไม้ที่มีเปลือกแตกซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์มีข้อปล้องหลายชนิด

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกหัวขวานสีตาล



ชื่อสามัญ
Rufous Woodpecker
ชื่อวิทยาศาสตร์
*Micropternus
brachyurus*
ชื่อวงศ์
Picidae
ชื่ออันดับ
Piciformes

นกหัวขวานสีตาล เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 24-25.5 ซม. ปากดำ หัวมีสีน้ำตาลเข้มแกมเขียว ขนลำตัวสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดง มีลายขวางสีดำเรียงเป็นแถวเช่นเดียวกับส่วนท้อง เพศผู้แตกต่างจากเพศเมียที่มีแถบสีแดงข้างแก้ม กินแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น มด ปลวก บางครั้งพบกินน้ำหวานและผลไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย พบขณะจิกกินแมลงร่วมกับนกไต่ไม้หน้าผากก้ำมะหยี่ และนกกินแมลง

ชนิดอื่น ๆ ตามกิ่งไม้และลำต้นหลักของไม้ยืนต้นริมถนน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจ ที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ												
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
A	LC	LC													

เหยี่ยวเพเรกริน

ชื่อสามัญ

Peregrine Falcon

ชื่อวิทยาศาสตร์

Falco peregrinus

ชื่อวงศ์

Falconidae

ชื่ออันดับ

Falconiformes



เหยี่ยวเพเรกริน เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 38-48 ซม. บริเวณหัว แถบหนวดมีสีดำ ตัดกับแก้มคอเป็นแถบสีขาวใหญ่ หนึ่งรอบตาและหนึ่งคลุมจมูก สีเหลือง ปลายปีกแหลมคล้าย 3 เหลี่ยม ออกันหางค่อนข้างสั้น ล่านกเป็นอาหารหลัก ในมหาวิทยาลัยพายุก โดยพบบริเวณอ่างเก็บน้ำ ขณะบินโฉบจับนกเอี้ยงหงอนอย่างรวดเร็วโดยใช้กรงเล็บขยี้มไว้ ก่อนจะบินออกไปจากอ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	NT	LC												

นกเขนน้อยปีกแถบขาว



ชื่อสามัญ
Bar-winged
Flycatcher-shrike
ชื่อวิทยาศาสตร์
Hemipus picatus
ชื่อวงศ์
Vangidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกเขนน้อยปีกแถบขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก ประมาณ 15 ซม. ตัวผู้มีสีน้ำตาลและขาวแกมเทา ต่อกมีสีขาว บริเวณปลายหางและปีกมีลายแถบสีขาว หลังมีสีน้ำตาลหรือดำ เพศเมียคล้ายกับเพศผู้ แต่บริเวณที่เป็นสีดำจะเป็นสีน้ำตาล กินแมลงเป็นอาหาร มีพฤติกรรมจิกกินตามกิ่งไม้ ใบไม้ และยอดไม้ บางครั้งโฉบจับแมลงกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะต้นไม้ตามเรือนยอด

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Ashy Woodswallow

ชื่อวิทยาศาสตร์

Artamus fuscus

ชื่อวงศ์

Artamidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกแอ่นพง เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 18 ซม. ปากสีน้ำเงินอ่อน ปีกเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งแตกต่างจากนกแอ่นและนกนางแอ่น ตัวเต็มวัยมีสีเทาเข้ม บริเวณอกและท้องสีจะจางกว่า มีลาดพาดสีขาวหรือเทาที่ปลายหาง หัวและตาสีดำ ลำตัวส่วนอื่น ๆ เป็นสีน้ำตาล โดยด้านบนจะเข้มกว่าด้านล่าง หางมีสีเทาเกือบดำ กินแมลงโดยการโฉบจับด้วยปาก กลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะเกาะรวมเป็นฝูงใหญ่ตามสายไฟ นอกจากนี้พบบินกลางอากาศตลอดช่วงกลางวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	☀	☀/☁	☀	☀	☀/☁	☁	☁	☁	☁	☁/☀	☀	☀

นกขมิ้นน้อยธรรมดา



ชื่อสามัญ

Common lora

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aegithina tiphia

ชื่อวงศ์

Aegithinidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกขมิ้นน้อยธรรมดา เป็นนกขนาดเล็กมาก ประมาณ 15 ซม. ลำตัวด้านบนเป็นสีเขียว วงรอบเข้าตาสีเหลือง ปีกและหางมีสีดำ มีลายแถบสีขาวที่ปีก ลำตัวด้านล่างสีเหลือง พบเกาะตามด้านข้างหรือด้านล่างของกิ่งไม้ เพื่อจิกแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเกาะตามใบไม้ กิ่งไม้ขนาดเล็กบนต้นไม้ กระโดดเพื่อหากินแมลง พบกระจายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว

ชื่อสามัญ

Great lora

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aegithina lafresnayei

ชื่อวงศ์

Aegithinidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว เป็นนกขนาดเล็กมาก ประมาณ 17 ซม. แตกต่างจากนกขมิ้นน้อยอื่นๆ ตรงที่ไม่มีลายแถบที่ปีก ตัวเต็มวัยอาจมีลายแต้มสีเขียว เพศผู้ลำตัวด้านบนสีอาจแตกต่างกัน ตั้งแต่สีเขียวไปจนถึงสีดำ โดยตะโพกเป็นสีเขียว กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะกระโดดไปหากินบนเรือนยอดไม้ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่พบเป็นคู่ ชุกชุมน้อยกว่านกขมิ้นน้อยธรรมดา

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกพญาไฟคอเทา



ชื่อสามัญ
Grey-chinned Minivet
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pericrocotus solaris
ชื่อวงศ์
Campephagidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกพญาไฟคอเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 18 ซม. เพศผู้บริเวณคอหอยเป็นสีเทาและมีสีส้มแทรก ด้านข้างของหัวเป็นสีเทา ลำตัวด้านล่างสีออกส้ม เพศเมียหัวเป็นสีเทา หน้าผากไม่มีสีเหลือง ส่วนลำตัวด้านล่างเป็นสีเหลืองเกือบตลอด ยกเว้นบริเวณคอหอยที่เป็นสีขาว วงรอบเข้าตาบางส่วนเป็นสีขาว กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะหากินร่วมกันเป็นฝูงหลาย 10 ตัว บินโฉบจับแมลงกลางอากาศ และจิกกินหนอนตามยอดไม้สูง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ												
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
ก	LC	LC													

นกพญาไฟแม่สะเรียง

ชื่อสามัญ

Short-billed Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pericrocotus

brevirostris

ชื่อวงศ์

Campephagidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกพญาไฟแม่สะเรียง เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 19 ซม. เมื่อสังเกตในธรรมชาติเพศผู้แทบไม่ต่างจากนกพญาไฟพันธุ์เหนือ แยกชนิดจากแถบปีก ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีแถบยาวต่อเนื่องคล้ายรูปตัว L คอว่า เพศผู้แถบสีแดง เพศเมียแถบสีเหลือง กินแมลงเป็นอาหาร โดยจิกกินตามยอดไม้ อาจโฉบกลางอากาศบ้างแต่ในระยะที่ไม่ไกลจากตำแหน่งเกาะ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะเกาะตามยอดไม้ค่อนข้างสูงเพื่อกระโดดหากินแมลง

บางครั้งบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ ส่วนใหญ่พบเป็นฝูงและบางครั้งหากินร่วมกันกับนกพญาไฟชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกพญาไฟพันธุ์เหนือ



ชื่อสามัญ

Long-tailed Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pericrocotus ethologus

ชื่อวงศ์

Campephagidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกพญาไฟพันธุ์เหนือ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 20 ซม. เมื่อสังเกตในธรรมชาติเพศผู้แทบไม่ต่างจาก นกพญาไฟแม่สะเรียงเพศผู้ ยกเว้นลำตัวด้านล่าง ซึ่งค่อนข้างเป็นสีส้มมากกว่า เพศเมียบริเวณหลัง เป็นสีเทาจนถึงสีเขียวเข้ม มีแถบแคบสีเหลืองบริเวณ หน้าผาก จําแนกชนิดจากแถบปีก แถบปีกเป็นเส้นยาว คล้ายตัว U เพศผู้แถบปีกสีแดง ส่วนเพศเมียแถบปีก สีเหลือง กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย พบไม่บ่อย โดยจะกระโดดหากินตามเรือนยอดไม้ ที่สูง จิกกินแมลงตามใบไม้ บางครั้งบินโฉบจับแมลง กลางอากาศ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น บางประชากรเป็นนกอพยพ
นอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกพญาไฟใหญ่

ชื่อสามัญ
Scarlet Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pericrocotus speciosus

ชื่อวงศ์
Campephagidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes



นกพญาไฟใหญ่ เป็นนกขนาดเล็ก ขนาด 20-22 ซม. เป็นพญาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพศผู้สีแดง บริเวณหัว คอ และหลังตอนหน้าเป็นสีดำ หลังและตะโพกเป็นสีแดง ปีกสีแดงสลับดำ ลำตัวด้านล่างเกือบทั้งหมดมีสีแดงยกเว้นคอหอย ส่วนเพศเมียสีเหลือง หน้าผากและเหนือตามีสีเหลือง ลำตัวด้านบนสีเทาแกมเหลือง ปีกและหางเหมือนกับเพศผู้แต่จะมีสีเหลืองแทนสีแดง ลำตัวด้านล่างทั้งหมดเป็นสีเหลือง กินแมลงชนิดต่าง ๆ และแมงมุม ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะจิกกินแมลงตามกิ่งไม้และยอดไม้

มีพฤติกรรมโฉบกินอาหารกลางอากาศใกล้กับบริเวณที่เกาะเช่นเดียวกับพญาไฟชนิดอื่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC												

นกพญาไฟสีเทา



ชื่อสามัญ

Ashy Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Pericrocotus
divaricatus*

ชื่อวงศ์

Campephagidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกพญาไฟสีเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 20 ซม. เพศผู้บริเวณหน้าผากและลำตัวด้านล่างสีขาว ลำตัวด้านบนสีเทา กลางกระหม่อมและท้ายทอย มีสีดำ หางสีดำ เพศเมียกระหม่อมและท้ายทอย มีสีเทา ในตัวไม่เต็มวัยจะไม่พบสีขาวยบริเวณหัว จิกกินแมลง หนอน ตามกิ่งไม้และยอดไม้สูง ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้ และยอดไม้ในระดับสูง จิกกินแมลงและหนอน ตามใบไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกพญาไฟสีกุหลาบ

ชื่อสามัญ

Rosy Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pericrocotus roseus

ชื่อวงศ์

Campephagidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกพญาไฟสีกุหลาบ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 20 ซม. เพศผู้แตกต่างจากนกพญาไฟชนิดอื่นตรงที่บริเวณหัวและลำตัวด้านบนมีสีเทา หน้าผากอาจมีลายพาดสีชมพู ลำตัวด้านล่างมีสีชมพู ส่วนเพศเมียแตกต่างจากนกพญาไฟชนิดอื่นตรงที่ตะโพกและขนคลุมโคนขนหางด้านบนมีสีจางกว่าหลัง และมีลายแต้มสีเหลือง คอหอยมีสีขาวแกมเทาและมีลายแต้มสีเหลือง ลำตัวด้านล่างที่เหลืองจะเป็นสีเหลืองจาง ๆ จิกกินแมลงตามยอดไม้หรือกิ่งไม้เป็นอาหาร บางครั้งโฉบอาหารกินกลางอากาศ ในบริเวณที่ใกล้กับตำแหน่งเกาะ ในมหาวิทยาลัย

พบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้และยอดไม้ในระดับสูงเพื่อจิกกินหนอนและแมลง มีพฤติกรรมคล้ายกับพญาไฟชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกอีเสือสีน้ำตาล



ชื่อสามัญ

Brown Shrike

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lanius cristatus

ชื่อวงศ์

Laniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกอีเสือสีน้ำตาล เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 20 ซม. ตัวเต็มวัยลำตัวด้านบนและหัวมีสีน้ำตาล แถบคาดตามีสีดำ คีวขาว บริเวณคอและลำตัวด้านล่างสีขาว สีข้างออกน้ำตาลอ่อน กินแมลงชนิดต่าง ๆ สัตว์เลื้อยคลานและนกขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า นกพบตามทุ่งโล่ง พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ ในมหาวิทยาลัย พบบ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้ พุ่มไม้ไม่สูงมาก ก่อนพุ่งตัวบินลงจับแมลงหรือเหยื่อที่เป็นอาหาร พบเกาะนิ่งตามกิ่งไม้บางครั้งส่งเสียงร้อง “แซ็ก-แซ็ก-แซ็ก”

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกอีเสือหลังแดง

ชื่อสามัญ

Burmese Shrike

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lanius collurioides

ชื่อวงศ์

Laniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกอีเสือหลังแดง เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 20 ซม. เพศผู้เต็มวัย บริเวณกระหม่อมท้ายทอย และหลังตอนบนมีสีเทา หน้าผากและด้านข้างของหัวสีดำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดง ไม่มีลาย ปีกและหางสีดำ มีแถบสีขาวบริเวณโคนขนปลายปีก เพศเมียลักษณะคล้ายกับเพศผู้แต่สีจางกว่า และมีสีขาวบริเวณหัวตา กินแมลงต่าง ๆ หนอน กบ กิ้งก่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะเกาะนิ่งตามกิ่งไม้โล่งที่ค่อนข้างเตี้ย บินลงพื้นเพื่อจับเหยื่อ พฤติกรรมการหากินคล้ายกับนกอีเสือสีน้ำตาล

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกอีเสือหัวดำ



ชื่อสามัญ
Long-tailed Shrike
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lanius schach
ชื่อวงศ์
Laniidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกอีเสือหัวดำเป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 25 ซม. หางยาวและปีกมีลายพาดสีขาวเป็นลักษณะเด่น ตัวเต็มวัยบริเวณหัว ปีก และหางมีสีดำ ตัดกับสีของลำตัวสีน้ำตาลแดง ขณะเกาะลำตัวเกือบตั้งตรง หางชี้ลงด้านล่างเสมอ กินอาหารจำพวก แมลง ตัวหนอน กบ กิ้งก่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะเกาะอยู่ตามยอดไม้ ฟูมไม่สูงและยอดไม้ริมน้ำ ส่วนใหญ่เกาะนิ่งอยู่กับที่ เป็นเวลานาน หากตกใจจะบินหนีไปไม่ไกลจากบริเวณเดิม พบบ่อยบริเวณอ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

ชื่อสามัญ

Black-naped Oriole

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oriolus chinensis

ชื่อวงศ์

Oriolidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกขมิ้นท้ายทอยดำ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 27 ซม. ปากสีเหลือง ขนลำตัวสีเหลืองแกมทอง มีลายแถบสีดำพาดผ่านตาไปจนถึงท้ายทอย ปีกและหางสีดำ ช่วงไหล่มีสีเหลืองแกมเขียว ในเพศเมียและตัวเกือบเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับเพศผู้ แต่สีบริเวณช่วงไหล่จะออกสีเขียวแกมเหลือง มากกว่า กินผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผลไม้เนื้ออ่อน เช่น ไทร หว้า โดยจิกกินหรือเด็ดผลออกมาจากกิ่งแล้วกินทั้งผล นอกจากนี้ยังกินน้ำหวานของดอกไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย

โดยส่วนใหญ่พบหากินตามลำพัง โดยมีพฤติกรรมจิกกินผลไทรหรือดิงผลออกจากขั้ว นอกจากนี้สามารถกลืนกินทั้งผลได้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกแขวงแขวหางปลา



ชื่อสามัญ

Black Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Dicrurus
macrocerus*

ชื่อวงศ์

Dicruridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกแขวงแขวหางปลา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 28 ซม. ตัวเต็มวัยสีดำ หางเว้าลึก ปลายขนหางคู่บนสุดโค้งขึ้นเล็กน้อย ในตัวไม่เต็มวัยมักมีลายเกล็ดสีขาวยบริเวณขนปีกด้านล่าง ออกตอนล่างท้อง และขนคลุมโคนขนหางด้านล่าง กินแมลงเป็นอาหาร เป็นนกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แสดงพฤติกรรมนี้เพื่อป้องกันอาณาเขตบริเวณรัง ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อยโดยจะเกาะอยู่โดดเดี่ยวตามสายไฟ กิ่งไม้ในพวงหญาไกล้แหล่งน้ำ พื้นที่ที่พบ เช่น บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกแขวงแซวสีเทา

ชื่อสามัญ

Ashy Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicrurus

leucophaeus

ชื่อวงศ์

Dicruridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกแขวงแซวสีเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 29 ซม. ซุดขนลำตัวสีเทา หรือสีเทาอ่อนจนถึงเทาเข้ม ขึ้นอยู่กับชนิดย่อย แต่ไม่ดำสนิทเหมือนแขวงแซวทั่วไป หางเว้าลึก กินแมลงเป็นอาหาร มีพฤติกรรมโฉบจับแมลงกลางอากาศ บินโฉบไล่คนที่มีความสูงกว่า โดยเฉพาะเหยี่ยวที่เข้าไปใกล้อาณาเขตที่ครอบครอง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะอยู่โดดเดี่ยว เกาะตามกิ่งไม้ในระดับค่อนข้างสูง บินโฉบจับแมลงในเรือนยอด หรือระหว่างเรือนยอดของต้นไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกแซงแซวปากกา



ชื่อสามัญ
Crow-billed Drongo
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dicrurus annectens
ชื่อวงศ์
Dicruridae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกแซงแซวปากกา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 28 ซม. ปากหนาและยาว โคนปากกว้าง หางเว้าตื้น ลำตัวอ้วน ตัวไม่เต็มวัยขนปีกด้านล่าง ออก ท้อง และ ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างมีลายเกล็ดสีขาว โอบจับ แมลงกลางอากาศใกล้ที่เกาะหรือระหว่างเรือนยอด เป็นอาหาร หากินตามกิ่งไม้ในระดับต่ำ หรือพุ่มหญ้า ระดับสูง ในมหาวิทยาลัยพบเห็นยาก โดยพบรวมกลุ่ม หากินและเกาะบนกิ่งไม้ บินโอบจับแมลงบนต้นปืบ บริเวณเกาะกลางถนน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพผ่าน

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกแขวงแขวเล็กเหลือบ

ชื่อสามัญ

Bronzed Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicrurus aeneus

ชื่อวงศ์

Dicruridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกแขวงแขวเล็กเหลือบ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 23 ซม. รูปร่างเพรียว ขนลำตัวสีดำเป็นมัน จมูกเป็นงาแวววาวสีเขียวหรือสีน้ำเงิน ขนปลายหางค่อนข้างสั้นเล็กน้อย กินแมลงเป็นอาหาร บินโฉบจับแมลงกลางอากาศไต่กลับกิ่งไม้ที่เกาะ โดยเฉพาะปลวกหรือแมลงเม่าที่บินออกจากรู ช่วงฝนตกหรือหลังฝนตก ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะโดดเดี่ยวตามกิ่งไม้โผล่ โดยเฉพาะช่วงที่ต้นไม้ออกดอก มักมีแมลงเข้าไปตอม นกแขวงแขวเล็กเหลือบจะเกาะนิ่งและรอโฉบจับแมลงกลางอากาศ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกแขวงแขวหางบ่วงเล็ก



ชื่อสามัญ

Lesser Racquet-tailed
Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicrurus remifer

ชื่อวงศ์

Dicruridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกแขวงแขวหางบ่วงเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 25 ซม. ลักษณะหัวดูล้ายแบนราบ ขนสีดำเป็นพุ่มคลุมโคนปาก ปลายหางตัดและ ขนหางคู่บนสุดมีก้านขนยื่นออกยาวออกไป ประมาณ 35-40 ซม. พบหากินร่วมกับนกที่กินแมลง เป็นอาหาร โอบจับแมลงกลางอากาศคล้ายกับพวก นกจับแมลง นอกจากนี้ยังกินน้ำหวานของดอกไม้ บางชนิด โดยเกาะบนกิ่งไม้หรือดอกไม้ แล้วใช้ปาก ดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ ในมหาวิทยาลัย จะพบบ่อย โดยจะบินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง

ส่วนใหญ่พบเห็นตัวขณะบินบ่อยกว่าเกาะนิ่ง ตามกิ่งไม้ในระดับสูง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกแขวงแขวหงอนขน

ชื่อสามัญ

Hair-crested Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicrurus hottentottus

ชื่อวงศ์

Dicruridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกแขวงแขวหงอนขน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง ประมาณ 32 ซม. ปากยาวและโค้ง ขนสีดำเป็นมันวาว แตกต่างจากนกแขวงแขวอื่น ๆ ตรงที่ปลายขนหาง คู่บนโค้งและงอขึ้นทำมุมมากถึง 90 องศาหรือมากกว่า บริเวณโคนปากมีขนยาว อาหารหลัก ได้แก่ น้ำหวานของดอกไม้ แต่พฤติกรรมการกินน้ำหวาน จะแตกต่างจากนกแขวงแขวอื่น ๆ ตรงที่จะบินมาเกาะ ตามยอดไม้หรือบนดอกไม้ ใช้ปากดูดกินน้ำหวาน จากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังโฉบกินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย

จะพบบ่อยในช่วงที่ต้นจ๊วและทองหลางป่าออกดอก พบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกแขวแขวหางบ่วงใหญ่



ชื่อสามัญ
Greater Racquet-tailed
Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dicrurus paradiseus

ชื่อวงศ์
Dicruridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกแขวแขวหางบ่วงใหญ่ เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง ประมาณ 32 ซม. แตกต่างจากนกแขวแขวหางบ่วงเล็ก ตรงที่มีขนาดใหญ่กว่า บริเวณโคนปากมีพุ่มขน ขนาดใหญ่และยาวปลายหางเว้า ขนหางคู่บนอก มีก้านขนยื่นยาวออกไปมาก ปลายก้านขนมีแผงขน เฉพาะทางด้านนอกแต่เพียงด้านเดียว ซึ่งแขวแขว หางบ่วงเล็กจะมีแผงขนทั้งสองด้าน ตัวไม่เต็มวัย พุ่มขนอาจสั้นและไม่มีก้านขนที่ขนหางคู่บนอก กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยส่วนใหญ่พบขณะบินเปลี่ยนตำแหน่งในการเกาะ ในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

White-throated Fantail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhipidura albicollis

ชื่อวงศ์

Rhipiduridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกอีแพรดคอขาว เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 19 ซม. ลำตัวด้านบนและด้านล่างสีเทาดำ คีวขาว คอหอยสีขาว ปลายขนหางสีขาว ในตัวไม่เต็มวัย จะออกสีน้ำตาล มีลายเกล็ดสีน้ำตาลแดง ปีกมีลายพาด คอหอยสีน้ำตาลเข้ม กินแมลงขนาดเล็ก และตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ คือ ส่งเสียงร้องและบิน โฉบจับแมลงกลางอากาศ จิกกินหนอนตามกิ่งไม้ ตามพุ่มไม้ พบเห็นอยู่เป็นคู่ มีความว่องไว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกจับแมลงจุกดำ



ชื่อสามัญ

Black-naped Monarch

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypothymis azurea

ชื่อวงศ์

Monarchidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกจับแมลงจุกดำ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 17 ซม. ปากสีฟ้าเข้ม เพศผู้ลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีน้ำเงิน มีจุดกลมสีดำบริเวณใกล้ท้ายทอย ออกมีลายพาดแคบ ๆ สีดำ ท้องและขนคลุมโคนขนทางด้านล่างมีสีขาว เพศเมียมีสีหม่นกว่าเพศผู้ แต่ไม่มีจุดสีดำบริเวณใกล้ ๆ ท้ายทอยและสีดำที่เป็นลายพาดที่คอ ออกมีสีออกเทา ส่วนลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทา กินแมลง ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะบินไปมาเพื่อจิกกินหนอนตามใบไม้ กิ่งไม้ในระดับสูง เป็นนกที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งกับที่

เช่นเดียวกับนกอีแพรด มีพฤติกรรมบินโฉบจับแมลง เมื่อมีภัยหรือสิ่งรบกวนจะส่งเสียงร้อง “แอ๋-แอ๋” ทำให้พบเห็นตัวได้ง่าย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Blyth's
Paradise-flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terpsiphone affinis

ชื่อวงศ์

Monarchidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกแขวสวรรค์ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 21 ซม. เพศผู้ขนหางคู่กลางยื่นยาวประมาณ 25 ซม. ในตัวเต็มวัยปากและวงรอบปากมีสีน้ำเงินสด เพศผู้มีภาวะสองแบบ คือ สีขาวและสีน้ำตาลแดง ที่พบบ่อยเป็นเพศผู้สีน้ำตาลแดง มีกระหม่อมสีดำ หัวและอกด้านบนสีเทาเข้ม ลำตัวด้านบน ปีก และหางมีสีน้ำตาลแดง เพศเมียมีลักษณะคล้าย นกเพศผู้ชนิดขนสีน้ำตาลแดงแต่ขนหางคู่กลาง ไม่ยื่นยาว โอบกินแมลงกลางอากาศใกล้กับบริเวณ ที่เกาะ ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะเกาะ

ตามกิ่งไม้โหล่งหรือต้นไม้ในระดับค่อนข้างสูง หากิน ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกาแวน



ชื่อสามัญ

Racquet-tailed Treepie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crypsirina temia

ชื่อวงศ์

Corvidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



กินอาหารจำพวกแมลง หนอนและสัตว์ขนาดเล็ก เป็นอาหาร บางครั้งพบกินผลไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก มักจะเกาะตามกิ่งไม้โผล่บนยอดไม้ บางครั้งพบบินผ่านเป็นฝูง เฉลี่ยจำนวนตัวที่พบจากการสำรวจในแต่ละครั้ง พบอยู่เป็นกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 3 ตัว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

นกกาแวน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง ขนาดตัวประมาณ 33 ซม. รวมหางซึ่งยาวประมาณ 20 ซม. ปากหนา ตาสีฟ้าเข้ม กะหม่อมมีขนคล้ายกำมะหยี่ สีลำตัวสีดำเหลือบเขียว หางยาวปลายหางแผ่

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ
Eastern Jungle Crow
ชื่อวิทยาศาสตร์
Corvus leuillanti
ชื่อวงศ์
Corvidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes



อีกา เป็นนกขนาดกลาง ขนาดตัวประมาณ 48-59 ซม. ปากสีดำ หนาเป็นสัน หน้าผกมีลักษณะเป็นสัน ตั้งเป็นมุมฉากกับปาก ขนลำตัวสีดำ หางสั้น เมื่อเทียบกับความยาวลำตัว เป็นนกที่ปรับตัวได้ดี กินอาหารได้หลากหลาย กินได้ทั้งพืช สัตว์ ล่าสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า งู และนก เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบกินซากสัตว์ตามพื้นถนน เป็นนกที่มีความฉลาด ร้องเสียงดัง “ก้า-ก้า” ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะบินผ่านขณะสำรวจในตอนเช้า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกจับแมลงหัวเทา



ชื่อสามัญ

Grey-headed
Canary-flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Culicicapa ceylonensis

ชื่อวงศ์

Stenostiridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกจับแมลงหัวเทา เป็นนกขนาดเล็กมาก ประมาณ 13 ซม. หัวมีลักษณะคล้ายเป็นพุ่มหงอน ขนสั้นๆ บริเวณหัว คอหอย และอกเป็นสีเทา ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง ส่วนลำตัวด้านล่าง สีเหลืองหรือสีทอง เป็นนกที่ค่อนข้างเชื่อง สามารถ เข้าใกล้ขณะสำรวจ โฉบแมลงกินกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะตามกิ่งไม้ ขนาดเล็กในที่โล่ง บินโฉบจับแมลงกลางอากาศ และกลับมาเกาะในตำแหน่งเดิม พบหากินร่วมกับ นกกินแมลงชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ
Black-headed Bulbul
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnonotus atriceps
ชื่อวงศ์
Pycnonotidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes



นกปรอดทอง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 17.5-19 ซม. ตัวสีฟ้า บริเวณตั้งแต่หัวถึงคอมีสีดำ ตั้งแต่ท้ายทอยลงไปถึงช่วงหางมีสีเหลือง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเหลืองหรือออกเทาในบางตัว ซึ่งหายาก เกือบสุดปลายหางมีสีดำเป็นแถบยาว ปลายขลิบสีเหลืองสด เสียงร้อง “จ๊ิบ” แหลมสูง คล้ายลูกไก่ กินผลไม้บริเวณปลายกิ่ง เช่น หว้า ตะขบ ไทร หรือแมลง ตัวหนอน ที่เกาะตามกิ่งไม้ ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะนิ่งบนยอดไม้

ตอนเช้าตรู่และช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณข้างถนน ทางขึ้นดอยง่ามที่มีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกปรอดเหลืองหัวจุก



ชื่อสามัญ
Black-crested Bulbul
ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnonotus flaviventris
ชื่อวงศ์
Pycnonotidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกปรอดเหลืองหัวจุก เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 18.5-19.5 ซม. หัวมีหงอนขนสีดำยาว ตาสีขาวหรือสีครีม หัวและคอสีดำ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างสีเหลือง ขณะเกาะมักส่งเสียงร้อง หากินตามพุ่มไม้และยอดไม้ อาหารได้แก่ ผลไม้ โดยเฉพาะ ไทร หว้า ตะขบ ตาเสือเล็ก อบเชย และไม้เถาบางชนิด นอกจากนี้ยังกินกลีบดอกไม้ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะดอกทองหลางป่า และจิกกินตัวหนอนและแมลงตามกิ่งและยอดไม้ ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะ

ตามกิ่งไผ่ กิ่งไม้โผล่ และเรือนยอดไม้ในช่วงที่ผลไม้กลุ่มไทรสุก มักพบหากินร่วมกับนกกินผลไม้หลายชนิด

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกปรอดหัวโขน

ชื่อสามัญ

Red-whiskered Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pycnonotus jocosus

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกปรอดหัวโขน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 18-20.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนจนถึงหางมีสีน้ำตาลแกมดำ ปลายหางแต้มสีขาว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาว ก้นสีส้ม ลักษณะเด่น คือ หัวมีหงอนคล้ายชฎาตั้งบนหัว โขนสีน้ำตาลแกมดำ แก้มสีขาว และหลังตามีแถบสีแดงป้ายอยู่ กินแมลง หนอน หรือผลไม้เล็กๆ เช่น ไทร ตะขบ หว้า และใช้ปากจิกกินผลไม้ขนาดใหญ่พวกมะละกอสุก มะม่วงสุก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย คาดว่าจะมีประชากรไม่มาก โดยจะเกาะบนปลายยอดไม้ในระดับสูง

และตามทุ่งหญ้าที่มีลักษณะเปิดโล่ง ส่วนใหญ่พบขณะเกาะนิ่งและส่งเสียงร้อง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	NT	LC												

นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง



ชื่อสามัญ

Brown-breasted Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Pycnonotus
xanthorrhous*

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 20 ซม. มีลักษณะเหมือนกับนกปรอดหัวสีเข้ม แต่ต่างตรงบริเวณอกจะมีสีน้ำตาลพาดผ่าน ขนตรงก้นมีสีเหลือง บริเวณหูเป็นสีน้ำตาล และไม่มีหัวโขนบริเวณหัว กินผลไม้และน้ำหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยที่สำรวจพบจะเกาะตามกิ่งไม้ และยอดไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกปรอดหัวสีเขม่า

ชื่อสามัญ

Sooty-headed Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pycnonotus aurigaster

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกปรอดหัวสีเขม่า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19-21 ซม. บริเวณหัวมีสีดำ ช่วงแก้มมีสีขาว บริเวณหลังถึงโคนหางมีสีน้ำตาล ขนคลุมโคนหางด้านบนมีสีขาว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเทา หางมีสีน้ำตาลออกดำแต่ปลายหางมีแถบสีขาว ก้นสีเหลืองหรือส้ม กินเมล็ดไม้ ผลไม้ แมลง และผลไม้ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบกระจายทั่วมหาวิทยาลัย เกาะรวมกลุ่มตามสายไฟ หากินร่วมกันเป็นฝูง มากกว่า 4 ตัว ส่งเสียงร้องขณะเกาะและบิน บางครั้งพบเกาะเพียงลำพังตามกิ่งไม้บนต้นไม้สูงมาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกปรอดคอลาย



ชื่อสามัญ

Stripe-throated Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Pycnonotus
finlaysoni*

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกปรอดคอลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19-20 ซม. บริเวณหน้าผากและลำคอ มีลักษณะเป็นขีดสีเหลืองกระจายทั่ว ตั้งแต่หัวลงมาถึงหางมีสีเทาอมเขียว บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีเทา ขนที่ก้นมีสีออกเหลือง ชอบกินเมล็ดไม้ ผลไม้ แมลง และผลไม้ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัย พบไม่บ่อย โดยจะเกาะบริเวณกิ่งไม้ ยอดไม้ พุ่มไม้ค่อนข้างสูง จากการสำรวจพบอยู่ตามลำพัง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Streak-eared Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pycnonotus conradi

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกปรอดสวน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 17.5-19.5 ซม. ขนลำตัวสีน้ำตาล บริเวณแก้มมีขีดสีขาว ดวงตาสีเทา กันมีสีน้ำตาลอ่อนออกเหลือง เป็นนกกินผลไม้ เช่น ผลตำลึงสุก มะม่วงสุก ไทรหว่า ชมพู่ มะละกอสุก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย พบบ่อย โดยจะบินและกระโดดหากินหนอนและแมลงตามกิ่งไม้ ยอดไม้ พุ่มไม้ พบได้หลากหลายพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มีไม้ให้ผล

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจ ที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกปรอดเล็กตาขาว



ชื่อสามัญ
Grey-eyed Bulbul
ชื่อวิทยาศาสตร์
Iole propinqua
ชื่อวงศ์
Pycnonotidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกปรอดเล็กตาขาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19-19.5 ซม. ลักษณะเด่นของหัวจะเป็นพุ่มหงอนต่ำ ๆ บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเหลืองหม่น ๆ (สีไพล) บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเทาออกเหลือง อาหารที่กินส่วนใหญ่เป็นผลไม้จำพวก หว้า ตะขบไทร หรือแมลง และหนอน ตามกิ่ง ก้าน ใบของไม้ใหญ่ ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะกระโดดหากินตามพุ่มไม้สูง ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงร้องมากกว่าการพบเห็นตัวโดยตรง ส่งเสียงร้อง “อ้าย-อ้าย” คล้ายเสียงร้องของแมว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกปรอดเทาหัวขาว

ชื่อสามัญ

White-headed Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Cerasophila
thompsoni*

ชื่อวงศ์

Pycnonotidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกปรอดเทาหัวขาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 20 ซม. ปากแดง หัวสีขาว มีแถบคาดตาสีดำสั้น ๆ ขนลำตัวสีเทาแกมขาว กันน้ำตาลแกมส้ม และขาสีแดงสด กินลูกไม้ขนาดเล็ก แมลง และน้ำหวานจากดอก เช่น ดอกทองหลางป่า ในมหาวิทยาลัยพวยาก โดยพบขณะกระโดดไปมา เพื่อหาแมลงบนเรือนยอดไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกนางแอ่นบ้าน



ชื่อสามัญ

Barn Swallow

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hirundo rustica

ชื่อวงศ์

Hirundinidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกนางแอ่นบ้าน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13-14 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินเข้มออกดำ บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาวถึงสีน้ำตาลเหลือง บริเวณหน้าผากมีแถบสีส้มรวมถึงคอกก็มีสีส้ม และมีแถบสีดำผ่านบริเวณคอมาถึงอกช่วงบน ขนหางคู่บนจะยาวกว่าคู่อื่น ๆ โฉบแมลงที่บินกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยส่วนใหญ่พบบินฉวัดเฉวียนบนอากาศ พบมากตามสายไฟ โดยเกาะอยู่เป็นฝูงใหญ่มากกว่า 100 ตัว ในช่วงเช้าตรู่ ส่วนบริเวณอ่างเก็บน้ำ

จะเกาะตามตอไม้ และกิ่งไม้แห้งริมอ่างเก็บน้ำเพื่อพักผ่อน บางส่วนบินโฉบแมลงกลางอากาศในช่วงเย็น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Striated Swallow

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cecropis striolata

ชื่อวงศ์

Hirundinidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกนางแอ่นลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 18.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินเข้มออกดำ บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาว มีขีดสีดำกระจายทั่วตั้งแต่คอจนถึงก้น ขนบริเวณตะโพกมีสีน้ำตาลแดง ขนหางค่อนข้างยาวกว่าคู่อื่นเช่นเดียวกับนกนางแอ่นบ้าน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบบินโฉบจับแมลงกลางอากาศตลอดทั้งวัน ร่วมกับนกแอ่นชนิดอื่น ๆ บางครั้งพบเกาะนิ่งตามกิ่งไม้แห้งที่ยืนต้นตาย บริเวณอ่างเก็บน้ำเพื่อพักผ่อนเช่นเดียวกับนกนางแอ่นบ้าน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระจ้อยคอขาว



ชื่อสามัญ

Yellow-bellied Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Abroscopus
superciliaris*

ชื่อวงศ์

Cettiidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจ้อยคอขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 9.5 - 11.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวอมเหลือง ตั้งแต่คอถึงอกมีสีขาว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเหลือง คีวมีสีขาวเป็นลักษณะเด่น และชัดเจน กินแมลง และตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินแมลงร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ ตามพุ่มไม้ไม่สูงมากนัก ค่อนข้างพบเห็นตัวยาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกะจิตสีคล้ำ

ชื่อสามัญ

Dusky Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus fuscatus

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกะจิตสีคล้ำ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12-12.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณลำตัวด้านล่างสีขาวออกน้ำตาล คีวเป็นขีดสีน้ำตาลแดง ขนที่ก้นมีสีเหลืองออกน้ำตาล ปากด้านล่างสีเหลืองด้านบนสีน้ำตาลเข้ม กินหนอนและแมลงตามกิ่งไม้ อาจโฉบแมลงกลางอากาศ และอาจกินผลไทร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยเกาะและกระโดดหากินบริเวณพุ่มไม้ระดับต่ำ พงหญ้ารกทึบ เพื่อจิกกินหนอนและแมลง ส่วนใหญ่พบเห็นอยู่โดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระจิดปากหนา



ชื่อสามัญ

Radde's Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus schwarzi

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิดปากหนา เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13.5-14 ซม. มีลักษณะคล้ายนกกระจิดสีคล้ำ แต่มีขนาดคิ้วสีน้ำตาลแดงลากยาวไปถึงคอ บริเวณลำตัวด้านข้างมีสีออกเขียว และขนบริเวณก้นมีสีออกเหลือง กินหนอนและแมลงตามกิ่งไม้ หรือโฉบแมลงกลางอากาศ และอาจกินผลไม้บางเหมือนกับนกกระจิดสีคล้ำ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามพุ่มไม้ระดับต่ำในพงหญ้ารกทึบ หรือใกล้พื้นดิน พบอยู่เดี่ยว ๆ ขณะกำลังหากิน บริเวณพงหญ้าใกล้แหล่งน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมอ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระจัดพันธุ์จีน

ชื่อสามัญ

Chinese Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus yunnanensis

ชื่อวงศ์

Phylloscopida

ชื่ออันดับ


Passeriformes



นกกระจัดพันธุ์จีน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 10 ซม. แถบบริเวณกลางกระหม่อม ไม่ชัด แถบตาสีคล้ำปลายเรียว ตะโพกมีแถบสีจาง กินแมลงและหนอน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดจิกกินหนอนตามกิ่งไม้แห้ง หากิน ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3



สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกระจิตรธรรมดา



ชื่อสามัญ

Yellow-browed
Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus inornatus

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิตรธรรมดา เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 11-11.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวอมเหลือง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาว คีวเป็นแถบสีขาวขีดมาถึงคอ บริเวณปีกมีสีขาวแซมบริเวณปลายปีก กินหนอน แมงมุมและแมลงตามกิ่งไม้เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบกระโดดหากินหนอนตามพุ่มไม้ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดอกปีบเริ่มเหี่ยวและใบสัณฐานใบอ่อน มักพบเห็นกระโดดจิกกินหนอน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	☁️/🌧️	❄️	❄️

นกกระจิดข้าวโลกเหนือ

ชื่อสามัญ

Arctic Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus borealis

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจิดข้าวโลกเหนือ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12.5 - 13 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวเข้ม บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาวครีม คิ้วเป็นแถบสีขาวขีตมาถึงคอ มีลักษณะคล้ายนกกระจิดสีคล้ำมาก กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหา กินตามพุ่มไม้ได้ตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงเรือนยอดไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกระจิดเขียวปีกสองแถบ



ชื่อสามัญ

Two-barred Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus plumbeitarsus

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิดเขียวปีกสองแถบ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12 ซม. ปากยาว ปากล่างสีส้ม ขนลำตัวด้านบนสีเขียวไพล ท้องด้านล่างขนสีขาวนวล แถบปีกสีขาวแกมเหลือง 2 แถบ แต่แถบปีกแถบแรกสั้นและแคบ แข้งและตีนสีชมพูอ่อน กินแมลงและหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกระโดดไปมาเพื่อจิกกินหนอนตามกิ่งไม้ และตามบริเวณที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่น เนื่องจากใบเป็นที่อยู่ของตัวหนอนซึ่งเป็นอาหารของนก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระจัดหัวมงกุฏ

ชื่อสามัญ

Eastern Crowned Leaf
Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus coronatus

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจัดหัวมงกุฏ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12.5-13 ซม. สีของลำตัวมีลักษณะคล้ายกระจัดสีคล้ำ แต่บริเวณหน้าผากจะมีสีเขียวออกคล้ำ บริเวณลำตัวด้านล่างสีขาวย ขนบริเวณก้นมีสีเหลืองอ่อน กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบหากินเป็นร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น กระโดดไปตามเรือนยอดและตามกิ่งไม้เพื่อหาหนอนและแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจ 1, 2, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกระจิดหางขาวใหญ่



ชื่อสามัญ

Claudia's Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phylloscopus claudiae

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิดหางขาวใหญ่ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 11.5-12 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวแกมเหลือง บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีขาวหรือสีเหลืองปนบ้าง บริเวณด้านในของขนหางคู่ในมีแถบสีขาวตลอดเส้น กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบเกาะตามกิ่งไม้และกระโดดหากินหนอน แมลงตามพุ่มไม้ระดับสูงและปานกลาง พบหากินเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 ตัว พบกระจายทั่วมหาวิทยาลัยในจุดที่มีต้นไม้หนาแน่นเนื่องจากมีส่วนของใบซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอน ดึงดูตให้นกกินแมลงเข้าไปใช้ประโยชน์ในการหากิน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระจ๋อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง

ชื่อสามัญ

Bianchi's Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Seicercus valentine

ชื่อวงศ์

Phylloscopidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจ๋อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวแกมเหลือง บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีเหลือง หน้าผกมีสีเทาเข้มเทา คิ้วเป็นสีดำหรือน้ำตาลเข้ม กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปมา จิกกินหนอนและแมลงตามพุ่มไม้สูงปานกลาง จากการสำรวจพบจิกกินหนอนในกอไผ่ที่ปลูกข้างถนน พบหากินร่วมกับนกกินแมลงออกเหลือง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกพงปากหนา



ชื่อสามัญ
Thick-billed Warbler
ชื่อวิทยาศาสตร์
Arundinax aedon
ชื่อวงศ์
Acrocephalidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกพงปากหนา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 18.5-21 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณลำตัวด้านล่าง โดยลำตัวด้านล่างจะออกสีเนื้อมากกว่า และหัวตามีสีขาว มีหนวดบริเวณมุมปาก กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ หรือโอบแมลงกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามพุ่มไม้ระดับต่ำหรือพงหญ้าใกล้แหล่งน้ำ เพื่อกะโดดไปมาหากินแมลง พบในบริเวณที่ค่อนข้างรก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระจิบบัวสีข้างแดง

ชื่อสามัญ

Rufescent Prinia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prinia rufescens

ชื่อวงศ์

Cisticolidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจิบบัวสีข้างแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 10.5 - 12.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลออกแดง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาวออกครีม ๆ ปีกด้านข้างตัวมีสีน้ำตาลออกแดงด้วยเช่นกัน คิ้วขาวคาดผ่านดวงตา หางด้านล่างมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเนื้อเป็นหยัก ๆ กินแมลงและตัวหนอน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะเกาะหากินในกอหญ้าระดับต่ำ กระโดดไปมาหาหากินแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ



ชื่อสามัญ

Plain Prinia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prinia inornata

ชื่อวงศ์

Cisticolidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13.5-15 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลอมเทา บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเนื้อหรือน้ำตาลอ่อน คิ้วและหัวตามีสีขาวเป็นขีดยาวพาดผ่านดวงตา หางยาวและด้านล่างของหางมีหยักสีขาวขีดขวาง บินหาหนอนและแมลงกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยเกาะหากินหนอนและแมลงบริเวณกอหญ้า ระดับต่ำ ปกติพบเห็นบ่อยโดยเฉพาะตามทุ่งหญ้าริมถนนในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระจิบบรรณดา

ชื่อสามัญ

Common Tailorbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Orthotomus sutorius

ชื่อวงศ์

Cisticolidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจิบบรรณดา เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 11-13 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวออกเหลือง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาวหรือสีเนื้อ หน้าผากมีสีส้ม หัวตาและคิ้วมีสีเนื้อ หางของตัวผู้จะมีขนาดยาว กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับต่ำในบริเวณที่ค่อนข้างโล่ง

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกระจิบคอดำ



ชื่อสามัญ

Dark-necked Tailorbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Orthotomus atrogularis

ชื่อวงศ์

Cisticolidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจิบคอดำ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 10.5-12 ซม. ลักษณะของสีบริเวณลำตัวมีสีเหมือนกับนกกระจิบธรรมดา แตกต่างตรงสีส้มบริเวณหน้าผากที่ยาวไปถึงบริเวณท้ายทอย และลักษณะเด่นอีกประการ คือ บริเวณคอจะมีแถบสีดำหรือน้ำตาลเข้มยาวมาถึงอกด้านบน กินแมลงและตัวหนอนอาจกินน้ำหวานของดอกไม้บางชนิดในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับต่ำ และทุ่งหญ้าในที่โล่ง เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนและแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกระวังไพรปากเหลือง

ชื่อสามัญ

White-browed
Scimitar Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pomatorhinus schisticeps

ชื่อวงศ์

Timaliidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกระวังไพรปากเหลือง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 21-23 ซม. บริเวณลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว จนถึงปลายหาง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาว บริเวณหัวมีแถบสีขาวคาดโคนปากยาวผ่านคิ้ว ถึงท้ายทอย และบริเวณท้ายทอยมีสีเหลืองคาดขวาง ปากแหลมค่อนข้างยาวสีเหลือง กินผลไม้ที่หั่นที่พื้น แมลง แมงมุม และตัวหนอน ในมหาวิทยาลัย พบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินบริเวณพุ่มไม้ และพื้นดิน หากินร่วมกับฝูงนกกะรัง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกินแมลงคอเทา



ชื่อสามัญ

Grey-throated Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stachyris nigriceps

ชื่อวงศ์

Timaliidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกินแมลงคอเทา เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12.5-14 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวออกเหลือง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลแดงหรือสีเนื้อ หน้าผากถึงหัวมีลายขาวดำเป็นขีด รวมถึงบริเวณลำคอจะมีสีเทาด้วย กินแมลงในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ ตามพุ่มไม้ หรือไม้พุ่มล่างเกือบติดดิน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกินแมลงอกเหลือง

ชื่อสามัญ

Pin-striped Tit Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mixornis gularis

ชื่อวงศ์

Timaliidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกินแมลงอกเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12.5-14 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวออกน้ำตาล บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเหลืองอ่อน และมีขีดสีดำบริเวณคอลงมาถึงระดับอก หน้าผกมีสีส้ม และคิ้วเป็นแถบสีเหลืองอ่อน กินแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยกระโดดหากินแมลงในกอไผ่ทั้งระดับต่ำและตามกิ่งไม้ที่ค่อนข้างสูง หากินร่วมกันกลุ่มนกรกระจัด

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกจาบดินอกลาย



ชื่อสามัญ

Puff-throated Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pellorneum ruficeps

ชื่อวงศ์

Pellorneidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกจาบดินอกลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 16-18 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลออกเขียว ลำตัวด้านล่างสีเหลืองอ่อนและมีจุดสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วบริเวณอกถึงท้องด้านล่าง หน้าผากสีน้ำตาลแดง คีวสีเหลืองอ่อนคาดยาวเป็นแถบเล็ก ๆ เหนือตา กินแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกระโดดหากินบนพื้นดินที่มีใบไม้แห้ง ร่วงอยู่กับพื้น จิกและพลิกใบไม้เพื่อหาแมลงใต้ใบ พบหากินโดยลำพังและหากินเป็นคู่ ส่งเสียงร้องบ่อยในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกินแมลงปากสีน้ำตาล

ชื่อสามัญ

Buff-breasted Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pellorneum tickelli

ชื่อวงศ์

Pellorneidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกินแมลงปากสีน้ำตาล เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13.5-15.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลออกเขียว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเหลืองแต่บริเวณคอมีขีดจาง ๆ ปากด้านล่างมีสีเนื้อ ตามีสีน้ำตาลออกแดง คิ้วเป็นสีเทาแคดยาว เป็นแถบ กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินตามพุ่มไม้เตี้ย และบริเวณใบไม้แห้งที่ร่วงกับพื้น พฤติกรรมการหากินคล้ายกับนกจาบดิน แต่หากินอยู่ตามพุ่มไม้ระดับต่ำมากกว่าบนพื้นดิน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกระรางสร้อยคอเล็ก



ชื่อสามัญ

Lesser Necklaced
Laughingthrush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garrulax monileger

ชื่อวงศ์

Leiothrichidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระรางสร้อยคอเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 28.5-30.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลแต่ปลายปีกเป็นสีน้ำตาลอมเขียว ปลายหางมีแถบสีขาว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีขาวออกเหลือง มีขนใต้ปีกและตรงกันเป็นสีเหลือง ลักษณะเด่น คือ มีแถบสีดำคาดตั้งแต่บริเวณตาลงมาถึงบริเวณอก ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าสร้อยคอ กินแมลงที่ขึ้นมาจากไต้ใบไม้ หอย หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมถึงผลไม้ที่ร่วงอยู่ตามพื้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปมาเพื่อพลิกใบไม้ กินแมลงตามพื้น หากินร่วมกับนกกระรางชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระรางสร้อยคอใหญ่

ชื่อสามัญ

Greater Necklaced
Laughingthrush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Garrulax pectoralis

ชื่อวงศ์

Leiothrichidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระรางสร้อยคอใหญ่ เป็นนกขนาดเล็ก - กลาง มีขนาดประมาณ 31.5-33 ซม. มีลักษณะคล้าย นกกระรางสร้อยคอเล็ก แตกต่างกันตรงบริเวณ แก้มสีเทาเป็นวงขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเส้นสีดำ ต่อเนื่องกับเส้นที่พาดอก ปีกมีแต้มสีดำบนขนคลุม บริเวณปลายปีก กินแมลงที่ขึ้นมาจากใต้ใบไม้ หอย หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมถึงผลไม้ที่ร่วง ตามพื้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยหากิน บริเวณใบไม้แห้งที่ร่วงอยู่กับพื้นเช่นเดียวกับ นกกระรางสร้อยคอเล็ก พบกระโดดไปมาหากิน ร่วมกับนกกระรางคอดำ อยู่ในพุ่มไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระรางคอดำ, นกชอฮู้



ชื่อสามัญ
Black-throated
Laughingthrush
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dryonastes chinensis
ชื่อวงศ์
Leiothrichidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกกระรางคอดำ หรือนกชอฮู้ เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 27-28 ซม. บริเวณลำตัวด้านบน มีสีเทาออกเขียว บริเวณหัวสีเทาเข้ม หน้าและคอ มีสีดำมาถึงอก บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเทาปนเขียว ปลายหางมีสีออกดำ แก้มสีขาว หากินแมลง หรือ หนอนบนพื้น หรือผลไม้สุกที่ร่วงหล่นตามพื้น เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจิกกิน แมลงบนพื้นหญ้าริมทางและผลไม้ที่หล่นตามถนน พบหากินเป็นฝูง ประมาณ 4-5 ตัว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	NT	LC												

นกกินแมลงตาเหลือง

ชื่อสามัญ

Yellow-eyed Babbler

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chrysomma sinense

ชื่อวงศ์

Sylviidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกินแมลงตาเหลือง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 18 ซม. บริเวณลำตัวด้านบน มีสีน้ำตาลแดงจนถึงปลายหาง ปีกมีสีออกแดง มากกว่าบริเวณหลัง บริเวณท้องด้านล่าง มีสีเนื้อ ออกมีสีขาว หางยาว ปากสั้นสีดำ รอบดวงตามีสีเหลือง กินแมลง หรือน้ำหวานของดอกไม้บางชนิดเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยเกาะนิ่งบริเวณพงหญ้า ริมนน หากินร่วมกับนกกระเจิบหญ้าสีข้างแดงและ ผุ่่นกปรอดหัวสีเขม่า

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกแว่นตาขาวสีข้างแดง



ชื่อสามัญ

Chestnut-flanked
White-eye

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zosterops erythropleurus

ชื่อวงศ์

Zosteropidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกแว่นตาขาวสีข้างแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 11.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวอ่อนจนถึงโคนหาง โดยปลายหางจะมีสีดำ บริเวณลำตัวด้านล่างตรงคอมีสีเหลืองอ่อน ท้องมีสีเทา และก้นมีสีเหลือง ลักษณะเด่น คือ รอบดวงตาจะมีสีขาวคล้ายแว่นตา และมีแถบสีแดงอยู่บริเวณข้างลำตัว กินหนอนและแมลง บางครั้งกินน้ำหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปมาบนเรือนยอดเพื่อจิกกินแมลง ในช่วงที่ดอกกาฝากออกดอกมักพบนกกินน้ำหวานจากดอกกาฝาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกแว่นตาขาวสีทอง

ชื่อสามัญ
Oriental White-eye

ชื่อวิทยาศาสตร์
*Zosterops
palpebrosus*

ชื่อวงศ์
Zosteropidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes



นกแว่นตาขาวสีทอง เป็นนกขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณ 11 ซม. ลำตัวด้านบนสีเขียวอ่อนถึงเขียว ท้องสีเทา ปกติมีแถบสีเหลืองจากตรงกลางหน้าอก ตอกลางจนถึงกลางท้อง บางตัวอาจไม่มีสีเทาที่ท้อง ทำให้เห็นเป็นสีเหลืองทั้งตัว อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ แมลง และตัวหนอน นอกจากนี้ยังกินน้ำหวาน จากดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดของไม้ต้น และยอดอ่อนของพืชบางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยหากินตามกิ่งไม้ เรือนยอดต้นไม้ที่สูงมากบริเวณป่าโปร่ง และป่าดิบ พบเห็นจิกกินแมลงตามพุ่มไม้ และบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม กินน้ำหวาน

จากดอกกาฝาก และแมลงบนต้นปีบ บางครั้งพบกินลูกไม้ขนาดเล็ก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่



ชื่อสามัญ

Velvet-fronted
Nuthatch

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sitta frontalis

ชื่อวงศ์

Sittidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

ที่อาศัยอยู่ตามเปลือกไม้ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยไต่หากินตามลำต้นหลักและกิ่งที่แตกแขนงของต้นไม้ จิกกินแมลงตามเปลือกไม้เพราะเป็นบริเวณที่แมลงและตัวอ่อนแมลงอาศัยอยู่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12-13.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำเงินเข้มจนถึงปลายหาง บริเวณลำตัวล่างมีสีเทา ตรงหน้าผากมีสีม่วงถึงดำเป็นแถบ ปากมีสีแดง เพศผู้มีคิ้วเป็นแถบสีดำยาวถึงคอ กินแมลงและหนอน

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

White-vented Myna

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acridotheres grandis

ชื่อวงศ์

Sturnidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกเอี้ยงหงอน เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดตัวประมาณ 25 ซม. ขนลำตัวโดยรวมสีดำ หัวมีพุ่มหงอน ขนยาว ขาและนิ้วสีเหลือง มีลายพาดสีขาวบริเวณโคนของขนปลายปีก เห็นได้ชัดขณะบิน ปลายหางมีแถบขนาดกว้างสีขาว ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีขาว ตาสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลแกมส้ม ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบกระจายทั่วมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นนกที่ปรับตัวได้เก่ง กินอาหารหลากหลาย พบเป็นฝูงมากกว่า 10 ตัว และอาศัยอยู่ร่วมกันกับนกเอี้ยงสาธิตาและนกกิ้งโครง ในช่วงที่ดอกจิวและทองหลางป่าออกดอก

มักพบนกเอี้ยงหงอนรวมตัวกินน้ำหวานบนต้นไม้ชนิดดังกล่าว หากหากินบนพื้นหญ้าจะเดินจิกกินเมล็ดหญ้าร่วมกันนกชนิดอื่น ๆ ในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ



จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกเอี้ยงสาริกา



ชื่อสามัญ

Common Myna

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acridotheres tristis

ชื่อวงศ์

Sturnidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

กินแมลง หนอน สัตว์ขนาดเล็กและธัญพืช ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบเดินหากิน บนลานหญ้าเป็นฝูงใหญ่ ในช่วงที่ดอกไม้ป่าออกดอก พบกินน้ำหวานร่วมกับนกกินน้ำหวานชนิดอื่น ๆ มีความซุกซมมากเทียบเท่ากับนกเอี้ยงหงอน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

นกเอี้ยงสาริกา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 25 ซม. เป็นชนิดเดียวในสกุลนี้ที่ขนคลุมปีกด้านล่างมีสีขาว ขนลำตัวสีน้ำตาลเข้ม บริเวณหัว คอหอย และอก ตอนบนเป็นสีดำ ปากหนังบริเวณวงรอบเบ้าตา และ นิ้วสีเหลือง ตามีสีแดงจนถึงน้ำตาลแดง ขณะบิน จะเห็นลายพาดสีขาวบริเวณโคนของขนปลายปีก

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกิ้งโครงคอดำ

ชื่อสามัญ

Black-collared Myna

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gracupica nigricollis

ชื่อวงศ์

Sturnidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกิ้งโครงคอดำ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 28 ซม. ปากใหญ่มีสีดำ หัวและคอหอยสีขาว มีแถบรอบคอสีดำ ลำตัวด้านบนสีดำเข้ม ปีกมีลายจุดสีขาว ตะโพกและปลายหางมีสีขาว บริเวณสีขาวทุกส่วนมักมีรอยเปื้อน หนึ่งบริเวณวงรอบเข้าตาสีเหลือง นิ้วสีเหลืองในตัวไม่เต็มวัยไม่มีแถบรอบคอสีดำ ลำตัวด้านบนสีออกน้ำตาลมากกว่า คอและอกสีเทาแกมน้ำตาลมีลายขีดสีขาว กินแมลงตัวหนอน สัตว์ขนาดเล็กและธัญพืช ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก

โดยพบเดินหากินตามพื้นหญ้า หรือเกาะรวมกันเป็นฝูงมากกว่า 10 ตัว บนต้นไม้ใหญ่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกเอี้ยงต่าง



ชื่อสามัญ
Asian Pied Myna
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gracupica contra
ชื่อวงศ์
Sturnidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกเอี้ยงต่าง เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 24 ซม. ตัวเต็มวัยบริเวณหัว คอ คอหอย และอกตอนบนเป็นสีดำ หน้าผากและด้านข้างของหัวมีลายแถบสีขาว ลำตัวด้านบนสีออกดำ ตะโพกและช่วงไหล่มีลายพาดสีขาว ลำตัวด้านล่างสีขาว ตาสีขาวแกมเทา วงรอบปากเป็นสีส้ม โคนปากสีแดงแกมส้ม ปลายปากสีขาว นิ้วสีเหลือง กินผลไม้ธัญพืช แมลง และตัวหนอน เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเดินหากินบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยร่วมกับนกเอี้ยงและนกกิ้งโครง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกิ้งโครงเกลบแก้มสีน้ำตาลแดง

ชื่อสามัญ

Chestnut-cheeked
Starling

ชื่อวิทยาศาสตร์


Agropsar philippensis

ชื่อวงศ์

Sturnidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกิ้งโครงเกลบแก้มสีน้ำตาลแดง เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดตัวประมาณ 16.5-17 ซม. เพศผู้หัวสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลแกมเหลือง บริเวณแก้มถึงข้างคอเป็นแถบเลอะสีน้ำตาลแดงเข้ม สีข้างและอกมีสีเทาเข้ม ท้องขาว หลังและปีกมีสีดำเหลือบม่วง ปีกมีแถบขาวคาดชัดเจน นกเพศเมีย คล้ายนกกิ้งโครงเกลบหลังม่วงดำตัวเมียมาก แต่หัวสีจางกว่าและแถบขาวที่ปีกต่างกัน ในมหาวิทยาลัยพวยาก โดยพบเพียงครั้งเดียว เกาะนั่งบนกิ่งไม้ หลังจากรวมฝูงกับนกกิ้งโครงเกลบหัวเทา

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกิ้งโครงเกลบหัวเทา



ชื่อสามัญ

Chestnut-tailed Starling

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sturnia malabarica

ชื่อวงศ์

Sturnidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกิ้งโครงเกลบหัวเทา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 18.5-20.5 ซม. ออกและลำตัวด้านล่าง น้ำตาลอ่อนแกมเทา สีข้างและขนหางค่อนข้างน้ำตาลแดง หลังเทาเข้ม ปลายปากสีเหลืองสด โคนปากสีน้ำตาลเงินแกมเทา หัวเทาแกมขาว ตาสีฟ้า อาศัยและหากินตามกิ่งไม้ บนต้นไม้ที่ทิ้งใบและมีดอกเต็มต้น โดยเฉพาะจี่งป่า และทองหลางป่าเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะกินน้ำหวานของดอกจี่งป่าและทองหลางป่าในช่วงที่ออกดอก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Oriental Magpie Robin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Copsychus saularis

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกางเขนบ้าน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19-21 ซม. ปากเรียวแหลม เพศผู้บริเวณลำตัวด้านบนมีสีดำไปถึงบริเวณคอและอก ส่วนอกลงไปถึงก้นสีขาว มีแถบสีขาวคาดที่ปีกเป็นแนวยาวลงมาปลายปีกรวมถึงปีกหางค่อนอกสีขาว เพศเมียมีลักษณะสีแตกต่างเพียงบริเวณที่เป็นสีดำจะมีสีเทาเข้มหรือจางกว่า กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบเกาะตามกิ่งไม้ระดับต่ำ ส่งเสียงร้องในตอนเช้าตรู่ จิกกินหนอนตามใบไม้และกิ่งไม้ บางครั้งพบจิกกินเมล็ดพืชที่หล่นตามพื้นดิน มักพบอยู่เป็นคู่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกาขเณดง



ชื่อสามัญ

White-rumped Shama

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kittacincla malabarica

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกาขเณดง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 21.5-28 ซม. เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย นกเพศผู้มีลำตัวด้านบนสีดํา ส่วนของตะโพก ขนคลุมโคนหาง และขนหางคู่บนอกสีขาว บริเวณลำตัวด้านล่างเป็นสีส้ม เพศเมียบริเวณลำตัวด้านบนสีเทาเข้ม บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีเหลืองหรือนํ้าตาลแดง กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย พบบ่อย โดยพบกระโดดจิกกินแมลงและหนอนตามพื้น หรือจิกกินแมลงตามพุ่มไม้ พบชุกชุมบริเวณกอไผ่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกจับแมลงสีคล้ำ

ชื่อสามัญ

Dark-sided Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Muscicapa sibirica

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกจับแมลงสีคล้ำ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 11.5-13 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเทาเข้มหรือสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีน้ำตาลเข้ม คอมีรอยขีดสีขาวขวางลงมาถึงอก และมีลายขีดสีเทาแกมน้ำตาลบริเวณด้านล่างของลำตัวแต่ไม่ค่อยเด่นชัด กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิ่งอยู่ตามลำพังบนกิ่งไม้โผล่ไม่สูงมาก มีพฤติกรรมบินโฉบแมลงกลางอากาศ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกจับแมลงสีน้ำตาล



ชื่อสามัญ
Asian Brown Flycatcher
ชื่อวิทยาศาสตร์
Muscicapa dauurica
ชื่อวงศ์
Muscicapidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกจับแมลงสีน้ำตาล เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 12.5-13.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอมเทา บริเวณลำตัวด้านล่างสีขาวผสมน้ำตาลอ่อน ปากแหลมเล็ก ปลายปากสีออกดำ โคนปากมีสีเหลือง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบบินไปมาตามกิ่งไม้แห่งในระดับไม่สูงมากนัก เพื่อจับแมลงกลางอากาศแล้วบินกลับมาเกาะที่เดิม หากินโดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง

ชื่อสามัญ

Hill Blue Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyornis banyumas

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 14-15.5 ซม. เพศผู้จะมีลำตัวด้านบนสีน้ำเงินตั้งแต่บริเวณหน้าผากจนถึงปลายหาง ด้านล่างลำตัวตั้งแต่คอถึงอกมีสีน้ำตาลแดง ท้องสีขาว เพศเมียจะมีลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยส่วนใหญ่เกาะตามกิ่งไม้ในป่าค่อนข้างทึบ ก่อนบินโฉบแมลงกลางอากาศ บางครั้งบินลงพื้นดิน เพื่อจิกกินแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว



ชื่อสามัญ

Indochinese Blue
Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyornis sumatrensis

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13.5-15.5 ซม. เพศผู้จะมีลำตัวด้านบนสีน้ำเงินตั้งแต่บริเวณหน้าผากจนถึงปลายหาง ด้านล่างลำตัวตั้งแต่คอถึงอกมีสีน้ำตาลแดงหรือเหลืองแว้ขึ้นไป ท้องสีขาว เพศเมียจะมีลำตัวด้านบนสีเทาอมน้ำเงิน (จางกว่าเพศผู้) จิกกินแมลงตามพื้นหรือลงมาโฉบกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะกิ่งระดับต่ำและบินโฉบจับแมลงกลางอากาศก่อนกลับมาตำแหน่งเดิม

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ร	LC	LC	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

ชื่อสามัญ

Verditer Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eumyias thalassinus

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกจับแมลงสีฟ้า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 15-17 ซม. ปากสั้นแหลม เพศผู้ขนลำตัวสีฟ้าแกมเขียวเข้ม หัวตาและแถบตาสีดำสั้น ๆ เพศเมียสีลำตัวฟ้าอ่อนแกมเทา หัวตาไม่ชัดเจนเท่าเพศผู้มีลายขีดขวางสีขาวบริเวณขนคลุมโคนหาง กินแมลงในมหาวิหยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะบนกิ่งไผ่สูง พบอยู่โดดเดี่ยว บางครั้งบินโฉบจับแมลงใกล้กับนกแซงแซว พบบ่อยในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกเอี้ยงดำ



ชื่อสามัญ

Blue Whistlingthrush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Myophonus caeruleus

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกเอี้ยงดำ เป็นนกขนาดเล็ก - กลาง มีขนาดประมาณ 30.5-35 ซม. บริเวณลำตัวมีสีน้ำเงินแกมม่วง และมีลายขีดขนาดเล็กสีจางกว่าสีของลำตัวกระจายอยู่ทั่วลำตัว สีเหลือง ขาสีดำ กินหนอน ไข่เดือน หรือหอยเป็นอาหาร นอกจากนี้กินผลไม้บางชนิด แมลง ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะบนอาคารและหลังคา

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกจับแมลงคอแดง

ชื่อสามัญ

Taiga Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficedula albicilla

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกจับแมลงคอแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 13-13.5 ซม. บริเวณด้านบนของลำตัวและหัวมีสีน้ำตาลเทา บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีขาวนวล รอบดวงตาสีขาว หางสีดำขอบสีขาว เพศผู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์บริเวณคอมีสีส้มอมน้ำตาล ขณะเกาะมักจะกระดกหางขึ้นลงพร้อมกับส่งเสียงร้อง “ตริ๊ด” กินแมลงเป็นอาหารในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้โผล่ในระดับต่ำ บินลงพื้นเพื่อจับแมลง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกระเบื้องฟ้า



ชื่อสามัญ

Blue Rockthrush

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monticola solitaries

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระเบื้องฟ้า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 21-23 ซม. เพศผู้ บริเวณลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลอมเทา รวมทั้งบริเวณด้านล่างของลำตัว และมีขีดลายคล้ายเกล็ดทั่วทั้งตัว เพศเมียบริเวณลำตัวมีสีน้ำตาลอมเทาและมีขีดดำคล้ายเกล็ดทั่วตัว เช่นเดียวกับเพศผู้ จิกแมลง และนอนตามพื้นดิน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามอาคาร บินลงจิกกินแมลงและนอนตามพื้นดิน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกยอดหญ้าหัวดำ

ชื่อสามัญ

Eastern Stonechat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saxicola maurus

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกยอดหญ้าหัวดำ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 14 ซม. เพศผู้ บริเวณลำตัวด้านบน หลัง ปีก หางและอกด้านบนมีสีดำ มีแถบสีขาวบริเวณคอและหัวปีก ตะโพกขาวอมน้ำตาล และมีแถบขาวที่ปีก เพศเมีย ลำตัวด้านบนมีสีเทาผสม ปีกมีสีเทาออกดำ ตะโพกมีสีน้ำตาลและปลายหางสีดำ กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนั่งบนพุ่มไม้ระดับต่ำบริเวณริมสระน้ำ หรือใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะพืชริมน้ำตามขอบอ่างเก็บน้ำ บินโฉบจับแมลงและกระโดดจิกกินหนอนตามพงหญ้าในช่วงเช้าตรู่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	-												

นกยอดหญ้าสีดำ, นกขี้หมา



ชื่อสามัญ
Pied Bushchat
ชื่อวิทยาศาสตร์
Saxicola caprata
ชื่อวงศ์
Muscicapidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกยอดหญ้าสีดำหรือนกขี้หมาเป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดประมาณ 14 ซม. เพศผู้มีบริเวณลำตัวด้านบนและด้านล่างสีดำ มีลายพาดสีขาวบริเวณโคนปีกและโคนหางด้านบน เพศเมียมีบริเวณลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอมดำ ขนคลุมโคนหางด้านบนสีน้ำตาลแดง กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิ่งบนพุ่มไม้ระดับต่ำบริเวณอ่างในช่วงเช้าตรู่ เมื่อเจอเหยื่อจะบินลงจับแมลงบริเวณลานหญ้าก่อนบินกลับขึ้นมากะบริเวณเดิมอีกครั้ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกยอดหญ้าสีเทา

ชื่อสามัญ

Grey Bushchat

ชื่อวิทยาศาสตร์

Saxicola ferreus

ชื่อวงศ์

Muscicapidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกยอดหญ้าสีเทาเป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 14.5–15.5 ซม. เพศผู้มีบริเวณลำตัวด้านบนสีเทา มีลายขีดสีดำกระจายบริเวณหลัง หัวมีสีดำ คิ้วและคอมีสีขาว บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีเทา เพศเมียมีบริเวณลำตัวด้านบนสีน้ำตาล คิ้วสีเหลืองและคอมีสีขาว ท้องด้านล่างมีสีน้ำตาลอ่อน แต่ออกมีสีน้ำตาลเข้มกว่า กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามยอดพุ่มไม้ ยอดหญ้า พบเป็นคู่ มีพฤติกรรมบินลงโฉบแมลงกลางอากาศก่อนบินกลับไปเกาะ

ในตำแหน่งเดิม พบบ่อยตามริมถนนที่มีพงหญ้าขึ้นข้างทาง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมานอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	-												

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง



ชื่อสามัญ

Golden-fronted
Leafbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chloropsis aurifrons

ชื่อวงศ์

Chloropseidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง เป็นนกขนาดเล็ก
ประมาณ 20 ซม. บริเวณหน้าผากมีสีส้มแกมสีทอง
มีลายแถบสีดำล้อมรอบคอหอยซึ่งมีสีน้ำเงิน
ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง ตัวไม่เต็มวัยมีสีเขียว
เกือบตลอดตัว และสีเหลืองจาง ๆ บริเวณหน้าผาก
กินผลไม้ น้ำหวานดอกไม้ แมลง และแมงมุมที่อยู่
ตามพุ่มไม้ และไม้ต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย
โดยพบหากินตามเรือนยอดไม้ระดับสูง หากินร่วมกับ
นกพญาไฟ สำนวณพบบ่อยบนต้นไม้ที่ออกดอก
และให้น้ำหวาน บางครั้งกระโดดไปมาจิกกินแมลง
ตามใบไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกาฝากก้นเหลือง

ชื่อสามัญ
Yellow-vented
Flowerpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dicaeum chrysorrheum

ชื่อวงศ์
Dicaeidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes



นกกาฝากก้นเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 9.5–10 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนถึงโคนหางและด้านหัวปีกมีสีเหลืองอมเขียว ด้านล่างของลำตัวมีสีขาวออกครีมและมีแต้มสีดำกระจายทั่วท้องด้านล่าง ขนคลุมโคนหางด้านล่างเป็นสีเหลืองอมส้ม กินเกสรและดูดน้ำหวาน และยังกินหนอนหรือแมลง รวมทั้งผลไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปตามกิ่งไม้ที่มีต้นกาฝาก น้ำหวานของต้นกาฝากโดยใช้ปากจิกพบหากินบนต้นไม้ต้นเดิมหลายครั้งที่ทำการสำรวจ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกาฝากสีเรียบ



ชื่อสามัญ
Plain Flowerpecker
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dicaeum minullum
ชื่อวงศ์
Dicaeidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกกาฝากสีเรียบ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 8–8.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอมเขียว บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลอ่อนอมเทา ปากสีดำ ตัวไม่เต็มวัยปากมีสีเนื้อ กินแมลง หรือหนอน เป็นอาหาร บางครั้งกินน้ำหวานของดอกไม้และจากผลไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปมาบนกิ่งของต้นไม้ที่มีต้นกาฝาก กินหนอนที่อยู่ตามกิ่งไม้แห้ง กระโดดและส่งเสียงร้อง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Scarlet-backed
Flowerpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dicaeum cruentatum

ชื่อวงศ์

Dicaeidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกสีชมพูสวน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 8.5–9 ซม. เพศผู้ บริเวณตั้งแต่หน้าผากถึงขนคลุมปลายหางมีสีแดงเป็นแถบกว้างต่อเนื่องลงมา ส่วนลำตัวด้านข้างตั้งแต่คอ ปีก และหางมีสีดำ บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีนวล นกเพศเมียลำตัวด้านบนมีสีเทาอมน้ำตาล ด้านล่างสีเทาอมขาว แต่บริเวณตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนมีสีแดง กินผลไม้และน้ำหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบบินเกาะตามกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นที่กาฝากออกดอก นอกจากนี้พบเห็นกระโดดไปมาเพื่อกินแมลงบนต้นไม้และกร่างที่มีผลสุก

บริเวณที่พบ


จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกินปลีแก้มสีทับทิม



ชื่อสามัญ

Ruby-cheeked Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chalcoparia singalensis

ชื่อวงศ์

Nectariniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



แกมเหลือง บริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเหลือง และบริเวณคอถึงอกช่วงบนมีสีน้ำตาลแดง กินน้ำหวานในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกินแมลงตามกิ่งไม้แห้ง ปรากฏตัวบ่อยบนต้นที่มีกาฝากออกดอก ใช้ปากเจาะบริเวณโคนดอกเพื่อกินน้ำหวาน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

นกกินปลีแก้มสีทับทิม เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 10.5–11 ซม. เพศผู้บริเวณลำตัวด้านบนตั้งแต่หน้าผากถึงขนหางเป็นสีเขียวมัน คอถึงอกช่วงบนสีส้มหรือน้ำตาลแดง เพศเมีย ลำตัวด้านบนตั้งแต่กระหม่อมถึงโคนหางมีสีเขียวหรือเขียว

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกินปลีดำม่วง

ชื่อสามัญ

Purple Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnyris asiaticus

ชื่อวงศ์

Nectariniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกินปลีดำม่วง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 10.5–11.5 ซม. เพศผู้ บริเวณลำตัวด้านบนคอ และอกมีสีม่วงเป็นมัน บริเวณด้านล่างของลำตัวมีสีม่วงออกดำ มีแถบสีน้ำตาลแดงกั้นระหว่างอกและท้อง เพศเมีย บริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวแกมเหลือง คอถึงอกสีเหลืองอ่อน ปลายหางเป็นแถบสีขาวแคบ กินน้ำหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกินน้ำหวานจากดอกกาฝาก เช่นเดียวกับนกกินปลีชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบกินแมลงตามปลายยอดไม้ที่แห้ง ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่โล่ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกกินปลีอกเหลือง



ชื่อสามัญ

Olive-backed Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cinnyris jugularis

ชื่อวงศ์

Nectariniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

สำหรับดูตกินน้ำหวาน กินน้ำหวานและแมลง
ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะกินน้ำหวาน
จากดอกกาฝากบนต้นปีบ พบจิกกินแมลงต่างๆ
และแมงมุมตามกิ่งไม้แห้ง

นกกินปลีอกเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด
ตั้งแต่ 10.5–11.5 ซม. บริเวณลำตัวด้านบน
มีสีเขียวคล้ำแกมเหลือง บริเวณด้านล่างของลำตัว
มีสีเหลืองสด ปลายหางด้านล่างสีขาว เพศผู้บริเวณคอ
และอกมีสีน้ำเงินมันวาว ปากแหลมโค้งและลิ้นยาว

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกินปลีคอแดง

ชื่อสามัญ

Crimson Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aethopyga siparaja

ชื่อวงศ์

Nectariniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกินปลีคอแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 11–13.5 ซม. เพศผู้ บริเวณกระหม่อม ขนคลุมหางด้านบน และขนหางมีสีเขียวมัน หัวปีกสองข้าง ด้านข้างของหัวและคอสีแดงสด คอและอกเป็นสีแดง ขนหางคู่กลางยาวกว่าคู่อื่น ๆ เพศเมีย บริเวณด้านบนและด้านล่างของลำตัว มีสีเขียวแกมเหลือง ปีกมีสีทองแดงแต้ม ตรงบริเวณหน้าท้องมีสีออกเหลือง หางยาวเว้าตื้น ปลายหางด้านล่างมีสีดำ กินน้ำหวาน แผลง และหนอน

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งของต้นไม้ที่ต้นกาฝากออกดอก ใช้ปากดูดกินน้ำหวาน พบกระโดดไปมาจิกกินแมลงบนต้นปอหุช้าง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกปลีกล้วยเล็ก



ชื่อสามัญ
Little Spiderhunter
ชื่อวิทยาศาสตร์
*Arachnothera
longirostra*
ชื่อวงศ์
Nectariniidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกปลีกล้วยเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 14–16.5 ซม. บริเวณหัวมีสีเทา ลำตัวด้านบน สีเขียวอ่อนถึงสีเขียว คอมีสีขาวแกมเทา บริเวณอกและด้านล่างของลำตัวสีเขียวอ่อนแกมเหลือง โคนหางสีเหลือง ปลายหางด้านล่างสีขาวแกมเทา รอบดวงตาและคิ้วสีขาว ปากยาวเรียวแหลม กินน้ำหวานและแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พบบ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้แห้ง ใบกล้วยแห้ง จิกกินแมลง แมงมุม นอกจากนี้พบสอดปาก เข้าไปกินน้ำหวานจากดอกกล้วย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกปลีกล้วยลาย

ชื่อสามัญ

Streaked Spiderhunter

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arachnothera magna

ชื่อวงศ์

Nectariniidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกปลีกล้วยลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 17–20.5 ซม. บริเวณตั้งแต่หัวถึงบริเวณลำตัวด้านบนมีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ลำตัวด้านล่างสีขาวแกมครีม มีขีดสีดำทั่วลำตัว ปากมีลักษณะโค้งเรียวยาวแหลมวิวัฒนาการมาสำหรับกินน้ำหวานจากปลีกล้วยและดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะใช้ปากสอดกินน้ำหวานจากดอกกล้วย พบบ่อยบริเวณดงกล้วยข้างถนน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกกระจอกบ้าน



ชื่อสามัญ

Eurasian Tree Sparrow

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passer montanus

ชื่อวงศ์

Passeridae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกกระจอกบ้าน เป็นนกขนาดเล็กมาก 14-14.5 ซม. หัวมีขนาดใหญ่ กระหม่อมสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลมีขีดสีขาวและสีดำแซม ลำตัวด้านล่างมีสีเนื้ออมเทา บริเวณหน้าและคอ ด้านข้างสีขาว หูมีแถบสีขาวเด่น ปากมีลักษณะเป็น กรวยสั้นสีเทาดำ หางสั้นและหยักเว้าตรงปลาย กินแมลง หนอนหรือเมล็ดหญ้าตามพื้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบบินหากินอยู่ทั่วไปตามริมถนน ลานหญ้า อาคาร เกาะตามกิ่งไม้ มักพบเป็นฝูง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Baya Weaver

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ploceus philippinus

ชื่อวงศ์

Ploceidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระจาบบรรณดา เป็นนกขนาดเล็กมาก 14.5–15 ซม. บริเวณหน้าผาก มีสีเหลืองอ่อน ปนน้ำตาล ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลและมีขีดลาย สีเหลือง ท้องสีเหลืองอ่อนปนน้ำตาลไม่มีลาย ปากหนารูปกรวยสีเนื้อผสมน้ำตาล ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้ บริเวณกระหม่อมจะมีสีเหลืองเข้ม หน้า คอและปากเป็นสีดำ กินเมล็ดหญ้า เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดไม้ รวมทั้งแมลง ตัวหนอน และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบอาศัยอยู่เป็นฝูงบินไม่สูงมาก พบชุกชุมบริเวณ

ริมอ่างเก็บน้ำ บินไปมาเพื่อกินเมล็ดหญ้าบริเวณ สันอ่างเก็บน้ำ พบบ่อยในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

นกกระติ๊ดตะโพกขาว



ชื่อสามัญ
White-rumped Munia
ชื่อวิทยาศาสตร์
Lonchura striata
ชื่อวงศ์
Estrildidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก ขนาดตั้งแต่ 11–11.5 ซม. บริเวณหน้าผาก หัว ลำตัวด้านบน คอ และอกมีสีน้ำตาลดำ มีลายสีขาวเล็ก จาง ๆ ขีดแซมทั่ว ตะโพกสีขาวเด่น ส่วนท้องมีสีขาว แซมน้ำตาล ปากเป็นรูปรวยหนาสีเทา หางสั้น มีติ่งแหลมโผล่มาตรงกลาง กินเมล็ดหญ้า เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดไม้ บางครั้งกินแมลงและ ตัวหนอน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบ บินเป็นฝูงขนาดใหญ่หากินตามทุ่งหญ้า ส่วนป่าไม้ พบเห็นเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กินเมล็ดไม้ พบหากิน ร่วมกับนกกระจัดและนกกินแมลงอกเหลือง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

นกกระตีดขี่หมู

ชื่อสามัญ

Scaly-breasted Munia

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lonchura punctulata

ชื่อวงศ์

Estrildidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกกระตีดขี่หมู เป็นนกขนาดเล็กมาก ขนาดตั้งแต่ 12-12.5 ซม. บริเวณหัวและลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนคอสีน้ำตาลคล้ำ ลำตัวด้านล่างสีขาว มีขีดสีน้ำตาลเข้มขีดคล้ายเกล็ดปลาทั่วบริเวณท้อง หางสั้นน้ำตาลมีสีขาวแกมเล็กน้อย ปากรูปกรวยหนาสีเทาเข้ม กินเมล็ดหญ้า หรือเมล็ดไผ่ บางครั้งกินแมลงและตัวหนอน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามทุ่งหญ้า ปลายกิ่งไผ่ริมถนน ส่วนใหญ่พบเป็นฝูง ประมาณ 10 ตัวขึ้นไป

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

นกเด้าลมหลังเทา



ชื่อสามัญ

Grey Wagtail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Motacilla cinerea

ชื่อวงศ์

Motacillidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes

นกเด้าลมหลังเทา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 19 ซม. คีวขาว บริเวณหัวและลำตัวด้านบนสีเทา ลำตัวด้านล่าง ตะโพกและขนคลุมโคนหางสีเหลือง ปีกสีดำมีแถบสีขาวแคบคาดกลางปีกหางสีดำยาว ขอบหางสีขาว ขาสีชมพู ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเดินหากินตามถนน ใกล้แหล่งน้ำ หากินตามลำพัง มีพฤติกรรมกระดกขึ้นลงตลอดเวลา เดินจิกกินแมลงและหนอนตามพื้น ขณะบินมีลักษณะบินเป็นลูกคลื่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

White Wagtail

ชื่อวิทยาศาสตร์

Motacilla alba

ชื่อวงศ์

Motacillidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกอุ้มบาตร เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 17-18 ซม. ปากแหลมเล็กสีดำ บริเวณหน้าผาก ท้ายทอยและหลังด้านบนมีสีดำ บริเวณท้องสีขาว และตรงหน้าอกมีสีดำลักษณะคล้ายบาตรคว่ำ ขาดำเพศผู้ลำตัวด้านบนมีสีดำปีกสีดำและมีแถบขาวขนาดใหญ่ เพศเมีย ลำตัวมีสีเทา แถบปีกสีขาว แต่มีขนาดเล็ก กินแมลงตามพื้น ในมหาวิทยาลัย พบไม่บ่อย โดยพบเดินหากินตามลานหญ้า วิ่งสลับเดินจิกกินแมลงตามพื้น และมีพฤติกรรม กระดกกันคล้ายนกเด้าลม

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC	❄️	❄️/☀️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

นกเค้าดินทุ่งเล็ก



ชื่อสามัญ
Paddyfield Pipit
ชื่อวิทยาศาสตร์
Anthus rufulus
ชื่อวงศ์
Motacillidae
ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกเค้าดินทุ่งเล็ก เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาดตั้งแต่ 15–16 ซม. บริเวณหัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม มีขีดสีน้ำตาลเหลืองกระจายทั่วบริเวณลำตัวด้านล่างมีสีเนื้อ ลำคอสีขาวมีขีดสีน้ำตาลเข้ม คิ้วเป็นเส้นสีขาวลากยาวเชื่อมกับแถบข้างลำคอ ปากมีขนาดเล็กและยาว โดยปากด้านบนมีสีน้ำตาลด้านล่างสีเหลือง กินแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยโดยพบเดินหากินตามพื้นหญ้า มีพฤติกรรมหากินคล้ายกับนกอุ้มบาตร

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจำถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.พ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Olive-backed Pipit

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anthus hodgsoni

ชื่อวงศ์

Motacillidae

ชื่ออันดับ

Passeriformes



นกเค้าดินสวน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 16-17 ซม. บริเวณหัวและลำตัวด้านบนมีสีเขียวแกมน้ำตาล มีขีดสีน้ำตาลจาง ๆ บริเวณด้านหลังคิ้วเป็นขีดยาวสีขาวและหัวตาสีเหลือง บริเวณตั้งแต่อกถึงท้องมีสีขาว มีขีดสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบหากินเป็นกลุ่มประมาณ 3-5 ตัว เดินกระดกกันหากินแมลงตามพื้น หากมีภัยหรือสิ่งรบกวนจะบินขึ้นเกาะบนกิ่งไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												



สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

Amphibians



อิงชาคำ



ชื่อสามัญ

Beautiful Pygmy Frog,
Marbled Pigmy Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microhyla pulchra

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura

อิงชาคำ เป็นกบขนาดเล็ก ลำตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม บนหลังมีลายสีเข้มเป็นรูปตัววี (V) หลายอันซ้อนกัน ใต้ขาหลังและด้านท้องมีสีเหลืองสด ตัวผู้มีได้คางสีดำ จะออกหากินในตอนกลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามพื้นที่หญ้าใกล้แหล่งน้ำ แอ่งน้ำขัง เศษใบไม้ทับถม ใกล้บ่อน้ำ และบนถนนในช่วงฝนตก พบชุกชุมบริเวณบ่อน้ำ มีนิสัยหมอบนิ่งอยู่กับที่เมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ ไม่ค่อยกระโดดหนี

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Pegu Rice Frog, Berdmore's
Narrow-mouthed Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์


Microhyla berdmorei

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura



อิงแม่หนาว เป็นกบขนาดเล็ก ตัวรูปทรงสามเหลี่ยม ปลายปากแหลม ลำตัวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา มีแถบรูปนาฬิกาทราย บริเวณท้ายทอย ได้ต้องมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อน จะออกหากินในตอนกลางคืนโดย กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เกาะบนใบบัวตามบ่อน้ำสำรวจพบบนถนนในคืนฝนตก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

อิงน้ำเต้า



ชื่อสามัญ

Ornate Chorus Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microhyla mukhlesuri

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura

อิงน้ำเต้า เป็นกบขนาดเล็ก ลำตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม ผิวหนังเรียบ ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน หรือสีคล้ำ บนหลังมีลายเป็นเส้นรูปน้ำเต้า บางตัวอาจจะมีลายจางจนมองไม่เห็น จะออกหากินในตอนกลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก เป็นชนิดที่มีความชุกชุมมากกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดอื่น พบอาศัยตามพื้นที่หญ้าใกล้แหล่งน้ำ ช่อนตัวได้ขอนไม้เศษใบไม้ที่กองทับถมตามพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างชื้น พบบ่อยโดยเฉพาะฤดูฝน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

ชื่อสามัญ

Dark-sided Chorus Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microhyla heymonsi

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura




อิงข้างดำ เป็นอิงขนาดเล็ก หัวเล็กและแหลม ท้องป่อง ลำตัวมีลักษณะแบน ท้องมีสีขาหรือออกเหลืองอ่อน แผ่นหลังบริเวณตรงกลางมีจุดสีดำขนาดเล็ก 1 คู่ แขนและขามีลายพาดสีจาง ว่องไวและกระโดดหนีได้ไกลเมื่อมีสิ่งรบกวนเข้าใกล้ จะออกหากินในตอนกลางคืนโดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่างๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบตามพื้นที่หญ้าบนพื้นดิน เศษใบไม้แห้งตามแหล่งน้ำขัง และถนนหลังฝนตก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

อิงอ่างบ้าน



ชื่อสามัญ

Malaysian

Narrowmouth Toad

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaloula pulchra

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura

อิงอ่างบ้าน เป็นอิงขนาดเล็ก หัวเล็ก ลำตัวอ้วนป้อม ผิวหนังเรียบ มีแถบสีน้ำตาลอ่อน สีครีม หรือสีส้มคาดตาผ่านด้านหลังไปจนถึง ขาหลัง ฝ่าตีนหลังตื้นหนาและแข็ง ใช้สำหรับขุดดิน จะหากินในตอน กลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร นิยมนำมาบริโภค ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบอาศัยอยู่ตามหลุมดินที่ค่อนข้างชื้น หรือมีน้ำขัง ในคืนฝนตกพบตามถนน รอดักกินแมลงใต้เสาไฟ ในตอนกลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

อิงลายแต้ม, อิงลายเลอะ

ชื่อสามัญ

Butler's Pigmy Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microhyla butleri

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura



อิงลายแต้ม หรืออิงลายเลอะ เป็นอิงขนาดเล็ก ผิวหนังหยาบ เป็นตุ่ม ปากมนกลม หัวเล็กและค่อนข้างแหลม ปลายนิ้วแผ่ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม สีบริเวณหลังออกน้ำตาลอ่อน ลายดำกระทั่วตัว ขามีขีดในแนวขวาง ตัวผู้มีสีคล้ำใต้คาง จะหากิน ในตอนกลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพวยาก โดยพบตามพื้นป่าที่รก ใกล้แหล่งน้ำขัง หรือลำห้วย หรือบริเวณพงหญ้าที่มีความชื้นสูง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

อิงหลังจุด, อิงหลังขีด



ชื่อสามัญ

Inornate Chorus Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Microhyla inornata

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura

อิงหลังจุด หรืออิงหลังขีด เป็นอิงขนาดเล็ก ลำตัวสีน้ำตาลเทา หรือน้ำตาลแดง ลวดลายบนหลังมีความผันแปร เพราะบางตัว ไม่มีลวดลาย บางตัวมีจุดสีเข้มรูปร่างกลมหรือเป็นทางยาวเรียงต่อกันเป็นแถวหลายแถว ด้านท้องสีขาว คางและส่วนต้นของหน้าอกมีลายจุดสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังมีพื้นสีน้ำตาลเหลือง และมีจุดประกระจาย จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องชนิดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พบไม่บ่อย โดยพบบริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ำ บึง บ่อน้ำ ในช่วงฤดูฝนทั้งบนถนน พื้นหญ้า หรือตามพื้นที่เปิดโล่ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Olive Crawl Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptolax

pelodytoides

ชื่อวงศ์

Microhylidae

ชื่ออันดับ

Anura



อิงกรายหนังปุ่ม เป็นอิงกรายขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว หน้าอกมีต่อม ขอบตาด้านบนสีส้มขีด ลำตัวสีเทาหรือสีน้ำตาล มีลายเลอะสีเข้มบริเวณหลัง ตามข้างลำตัวมีลายจุดสีดำ ขอบปากมีขีดสีดำ ท้องสีขาวดินไม่มีพังผืด ปลายนิ้วเรียวยาว จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบบริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ำ ปึง บ่อน้ำ ส่วนใหญ่พบตามแหล่งน้ำนิ่ง เกาะบนใบไม้แห้ง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

กบกา



ชื่อสามัญ

Limborg's Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Limnonectes limborgi

ชื่อวงศ์

Dicroglossidae

ชื่ออันดับ

Anura

กบกา เป็นกบขนาดเล็ก ปลายหัวมีสีเหลืองออกน้ำตาลหรือสีเทาอ่อน บางตัวมีเส้นสีเหลืองพาดผ่านกลางหลังจนถึงกันข้างหัวมีแถบเส้นสีดำพาดผ่านตาไปถึงไหล่ ขามีแถบสีเข้มใต้ท้องสีขาว บางตัวมีจุดแต้มสีน้ำตาลที่คอ จะออกหากินเวลากลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่ยาก โดยพบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้น มีใบไม้ทับถมหนาแน่น มักอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Grass Frog, Rice Field

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fejervarya limnocharis

ชื่อวงศ์

Dicroglossidae

ชื่ออันดับ

Anura



กบหนอง เป็นกบขนาดกลาง หน้าเล็กยาว สีสันและลวดลาย มีความแปรผันหลากหลาย บางตัวมีแถบสีเขียว สีครีม สีเหลือง สีส้ม หรือสีน้ำตาล พาดผ่านกลางหลังจากปลายจมูกถึงกัน รอบปากสีขาวครีมสลับกับสีเข้ม ใต้ท้องสีขาว จะออกหากิน ในเวลากลางคืน โดยกินแมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง ขนาดเล็ก เช่น จิ้งจก เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบบริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ำ บึง บ่อน้ำ พบบ่อยในช่วงฤดูฝน ทั้งบนถนน ทุ่งหญ้า หรือตามพื้นที่เปิดโล่งสามารถพบเห็น ตัวได้ตลอดทั้งปี

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

กบหงอน



ชื่อสามัญ

Capped Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Limnonectes
gyldenstolpei*

ชื่อวงศ์

Dicroglossidae

ชื่ออันดับ

Anura

กบหงอน เป็นกบที่มีหัวขนาดใหญ่ ขนาดตัวปานกลาง ระหว่างตาทั้งสองมีติ่งหนังเรียบกลม นูนยาวออกมาทางด้านหลังตา ติ่งหนังเป็นอิสระไม่ติดกับหัว ซึ่งกบหงอนเพศผู้มีติ่งหนังใหญ่กว่าเพศเมีย มีลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ท้องมีสีเหลืองอ่อน ๆ จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ เป็นอาหาร เช่น ปลวก จิ้งหรีด ตั๊กแตน และกิ้งกือ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบบนถนนและลานหญ้าหน้าบ้านพักรับรองตรงข้ามกับบ้านพักรับรองอธิการบดี ในคืนฝนตกจะออกมาดักกรอกินแมลงใต้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านพัก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

เขียดทราย, เขียดหลังปุ่มที่ราบ

ชื่อสามัญ

Marten's Puddle Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Occidozyga martensii

ชื่อวงศ์

Dicroglossidae

ชื่ออันดับ

Anura



เขียดทราย หรือเขียดหลังปุ่มที่ราบ เป็นกบขนาดเล็ก ลำตัวมีสีเทาอมน้ำตาล ผิวหนังเป็นปุ่มขนาดเล็กกระจายตามตัว ในฤดูผสมพันธุ์เพศเมียจะมีหัวสีส้ม จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามแหล่งน้ำขัง มักแช่ตัวและโผล่ส่วนหัวขึ้นมา กระจายและพบได้ทั่วไปตามริมน้ำ บนพื้นหญ้าใกล้แอ่งน้ำหรือบนถนนหลังฝนตก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

คางคกบ้าน



ชื่อสามัญ

Asian common toad,
Black-spined toad

ชื่อวิทยาศาสตร์

Duttaphrynus melanostictus

ชื่อวงศ์

Bufonidae

ชื่ออันดับ

Anura

คางคกบ้าน เป็นคางคกขนาดกลาง ลำตัวอ้วนป้อม มีต่อมพิษขนาดใหญ่อยู่บริเวณหลังตา ลำตัวมีสีที่แปรผันสูง เช่น สีน้ำตาล สีเหลืองอมน้ำตาล สีเทาอมน้ำตาล ผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำ มีจุดดำบนสีดำ ด้านท้องมีสีขาวหรือสีครีม จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินกลุ่มสัตว์ขาปล้องเป็นอาหารหลัก เป็นชนิดที่มีรายงานการบริโภคเป็นอาหารเปิบพิศดาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบได้หลากหลายพื้นที่ทั้งบริเวณอาคาร หุ่นยนต์และพื้นที่ป่า เนื่องจากเป็นสัตว์ชนิดที่ปรับตัวได้ดีในทุกสภาพพื้นที่

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

เขียดบัว, เขียดจิก

ชื่อสามัญ

Green paddy frog,
Red-eared frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hylarana erythraea

ชื่อวงศ์

Ranidae

ชื่ออันดับ

Anura



เขียดบัว หรือเขียดจิก เป็นกบขนาดกลาง มีสันสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนที่ขอบหลังลากจากหลังตาจนถึงขาหลัง เห็นได้ชัดเจน ด้านหลังสีเขียว ริมฝีปากละทอสีขาวหรือเหลืองครีม ขาหลังมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือสีเทา ไม่มีแถบคาดผ่าน กินแมลงเป็นอาหารหลัก พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน ออกมาเกาะตามใบบัวหรือพืชน้ำต่าง ๆ จะออกหากินในตอนกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามแหล่งน้ำนิ่ง เกาะบนใบบัว พื้นหญ้าใกล้บ่อน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

กบนา



ชื่อสามัญ

East Asian Bullfrog,
Common Lowland Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hoplobatrachus rugulosus

ชื่อวงศ์

Dicoglossidae

ชื่ออันดับ

Anura

กบนา เป็นกบขนาดใหญ่ ลำตัวอ้วนสั้น ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวมะกอก มีตุ่มนูนเป็นสันสั้น ๆ เรียงเป็นเส้นประกระจายตามแผ่นหลัง บางตัวมีเส้นสีขาวพาดกลางหลัง นิ้วตีนหน้าสั้นและมนกลม ตีนหลังมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว จะออกหากินในเวลากลางคืนโดยกินแมลงเป็นอาหารหลัก มีรายงานการบริโภคเป็นอาหารและมีการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Four-lined Tree Frog

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Polypedates
leucomystax*

ชื่อวงศ์

Rhacophoridae

ชื่ออันดับ

Anura



ปาดบ้าน เป็นปาดขนาดใหญ่ ขาหลังยาว ตีนหลังมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว ตีนหน้าไม่มีพังผืด ปลายนิ้วตีนหน้าขยายออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผิวหนังเรียบ ลำตัวสีเหลืองส้ม หรือสีเหลืองอมน้ำตาลไปจนถึงสีน้ำตาลอ่อน จะออกหากินในตอนกลางคืน โดยอาหารหลัก ได้แก่ แมลง และสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตน และแมลงสาบ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบได้ในพื้นที่อาศัยทุกประเภท ตามบริเวณอาคาร พื้นที่กิจกรรมชาติไปจนถึงป่าธรรมชาติ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ปาดกระเปา



ชื่อสามัญ

Dwarf Bushfrog

ชื่อวิทยาศาสตร์

Philautus parvulus

ชื่อวงศ์

Rhacophoridae

ชื่ออันดับ

Anura

ปาดกระเปา เป็นปาดขนาดเล็กมาก ผิวบริเวณระหว่างตาและท้ายทอยมีแต้มรูปสามเหลี่ยมบนหลังมีลายเป็นเส้นโค้งเว้า 1 คู่ ขามีลายพาดสีเข้ม เพศผู้ส่งเสียงร้อง ตึกๆ เพื่อเรียกเพศเมีย ในฤดูผสมพันธุ์ จะออกหากินในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบตามลานหญ้า ใกล้แหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3



สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	สผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

สัตว์เลื้อยคลาน

Reptiles



เต่าใบไม้พม่า, เต่าห้วยท้องดำ



ชื่อสามัญ
Burmese Leaf Turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์
Cycllemys oldhami
ชื่อวงศ์
Geoemydidae
ชื่ออันดับ
Testudines

เต่าใบไม้พม่า หรือเต่าห้วยท้องดำ เป็นเต่าขนาดเล็ก กระดองมีลักษณะกลมมน มีสันกลางกระดอง ขอบกระดองหยัก มักจะออกหากินในตอนกลางวันตามพื้นป่า กินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำ กุ้ง ปู ปลา ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกินซากพืชและซากสัตว์ที่ทับถมบนพื้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเพียง 2 ครั้ง บริเวณดงกล้วยที่มีน้ำขัง และบริเวณลำห้วย ครั้งแรกพบแช่ตัวอยู่ในแอ่งน้ำขนาดเล็กที่มีร่มเงาในดงกล้วย และครั้งที่สองพบนอนอยู่ในร่องของล้อรถที่มีน้ำขังใกล้ลำห้วย

บริเวณที่พบ
จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	NT	-												

ชื่อสามัญ
Common Sun Skink

ชื่อวิทยาศาสตร์
Eutropis multifasciatus

ชื่อวงศ์
Scincidae

ชื่ออันดับ
Squamata




จิ้งเหลนบ้าน เป็นจิ้งเหลนขนาดใหญ่ ลำตัวอวบ ปกติตามลำตัวมีสีน้ำตาลทอง บางตัวมีเส้นสีดำหรือเทาคาดตามแนวยาวบริเวณด้านหลังลำตัว มีจุดสีดำและขาวกระจายทั่วบริเวณสีข้างลำตัวจนถึงโคนหาง ท้องมีสีเทาหรือมีสีจางจนเป็นสีเทาออกขาว ส่วนมากกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร มีกิจกรรมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยอาศัยอยู่ตามพื้นโล่ง บริเวณที่มีใบไม้ทับถม ซอกหลืบตามตัวอาคาร พื้นที่ป่าที่ค่อนข้างโล่งไปจนถึงป่าธรรมชาติที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

จิ้งเหลนหลากหลาย



ชื่อสามัญ

Bronze Mabuya,
Bronze Skink

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eutropis macularius

ชื่อวงศ์

Scincidae

ชื่ออันดับ

Squamata

จิ้งเหลนหลากหลาย เป็นจิ้งเหลนขนาดกลาง ลำตัวค่อนข้างอวบ ด้านหลังมีสีน้ำตาล ด้านข้างลำตัวมีสีดำ มีจุดสีขาวกระจายตามสีข้างลำตัว บริเวณใต้คางจนถึงคอ มีสีส้มจนถึงสีทองแดง มักพบหากินในตอนกลางวัน โดยกินสัตว์ขาปล้องรวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยอาศัยอยู่ตามพื้นดิน ซ่อนตัวตามก้อนหิน กองใบไม้แห้ง เคลื่อนตัวได้รวดเร็ว เมื่อเจอสิ่งรบกวนจะวิ่งหนีและหยุดเป็นระยะ ๆ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.พ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าหัวแดง

ชื่อสามัญ

Common Garden
Lizard

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calotes versicolor

ชื่อวงศ์

Agamidae

ชื่ออันดับ

Squamata



กิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าหัวแดง เป็นกิ้งก่าขนาดกลาง หางมีความยาวมากกว่าลำตัวสองเท่า มีความผันแปรของสีบนลำตัวตามอายุ ในฤดูผสมพันธุ์ส่วนหัวและลำตัวด้านหน้าของเพศผู้จะออกสีแดงส้มสด ส่วนเพศเมียมีสีน้ำตาลคล้ำ จะออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินแมลง และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น มด ด้ว และด้กแตน เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะหากินบนพื้น และเกาะลำต้นของต้นไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	-	❄️	☀️/❄️	☀️	☀️	☀️/☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️/❄️	❄️	❄️

กิ้งก่าหัวสีฟ้า



ชื่อสามัญ

Blue Crested Lizard

ชื่อวิทยาศาสตร์

Calotes mystaceus

ชื่อวงศ์

Agamidae

ชื่ออันดับ

Squamata

กิ้งก่าหัวสีฟ้า เป็นกิ้งก่าขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ มีหนามขนาดเล็กบริเวณเหนือช่องเปิดหู หัวโต มีสีฟ้าเด่นชัด ในกิ้งก่าเพศผู้ โดยเฉพาะฤดูผสมพันธุ์ แตกต่างกับเพศเมีย ที่สีลำตัวเป็นสีน้ำตาล จะออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินแมลงเป็นอาหาร เช่น มด แมลงสาบป่า และด้วง เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิ่งตาม โคนต้นไม้ และลำต้นของไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ริมทาง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Common House
Gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gekko gekko

ชื่อวงศ์

Gekkonidae

ชื่ออันดับ

Squamata



ตุ๊กแกบ้าน เป็นตุ๊กแกขนาดใหญ่ มีเกล็ดขนาดเล็ก สีเทาอมฟ้าปกคลุมตามลำตัว มีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแนวขวางลำตัวบริเวณด้านหลัง และมีจุดสีส้มหรือแดงกระจายตามด้านบนลำตัวจนถึงบริเวณหาง นิ้วตีนมีลักษณะเป็นแผ่นเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับพื้นผิววัสดุต่าง ๆ จะออกหากินในตอนกลางคืน โดยสามารถกินอาหารได้หลากหลาย ได้แก่ แมลง หรือสัตว์ขาปล้องอื่น ๆ รวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น งู หนู และจิ้งจก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามบริเวณ

ตัวอาคาร บ้านพักเพื่อรูดักกินแมลง ส่วนในพื้นที่ธรรมชาติพบตามพื้นดินและบริเวณถนน รูดักกินแมลงตามพื้น

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ก	LC	LC												

จิ้งจกบ้านหางหนาม



ชื่อสามัญ

Spiny-tailed
house gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemidactylus frenatus

ชื่อวงศ์

Gekkonidae

ชื่ออันดับ

Squamata

จิ้งจกบ้านหางหนาม เป็นจิ้งจกขนาดกลาง เกล็ดลำตัวมีขนาดเล็กละเอียด สีลำตัวมีความแปรผันหลากหลาย ตั้งแต่สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีครีมหรือสีเทา นิ้วตีนมีลักษณะแผ่แบนสำหรับใช้ยึดเกาะได้ดี มีเล็บตีนขนาดเล็กที่สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้ง 5 นิ้ว กินแมลงเป็นอาหาร อาจพบจิ้งจกบ้านหางหนามที่อาศัยอยู่ตามอาคาร บ้านเรือนกินเศษอาหารเป็นบางครั้ง สามารถพบตัวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยอาศัยอยู่ตามอาคารเรียนและบ้านพัก แต่ไม่พบในบริเวณป่าธรรมชาติ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

จิ้งจกบ้านหางแบน

ชื่อสามัญ

Common Frilled Gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Hemidactylus
platyurus*

ชื่อวงศ์

Gekkonidae

ชื่ออันดับ

Squamata



จิ้งจกบ้านหางแบน เป็นจิ้งจกขนาดกลาง สีลำตัวมีความผันแปรสูง มีสีตั้งแต่เทาจนทำให้ลวดลายดูไม่ชัดเจน ไปจนถึงลำตัวสีคล้ำเกือบดำ มีลายแต้มบริเวณกลางหลังสีเข้ม 3-4 จุด เท้ามีพังผืดเยาะกว่าจิ้งเหลนบ้านหางหนาม กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร สามารถพบตัวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบอาศัยอยู่ตามอาคาร บ้านพัก เสาไฟ คอยดักกรอจับแมลงตามจุดที่มีแสงไฟ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 1 และ 2

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูปีแก้วลายแต้ม



ชื่อสามัญ
Banded Kukri Snake
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oligodon fasciolatus
ชื่อวงศ์
Colubrinae
ชื่ออันดับ
Squamata

งูปีแก้วลายแต้ม เป็นขนาดเล็กในกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลัง แต่ไม่เป็นอันตรายต่อคน ลำตัวค่อนข้างกลม ลำตัวป้อมสั้น เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นใหญ่ มีแถบสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำคาดตาไปจนถึงริมฝีปากบน แถบคาดมีลักษณะเป็นรูปตัววี (V) สามชั้นบริเวณหัว ลวดลายและสีสันของลำตัวมีความแปรผันสูง มีลำตัวสีน้ำตาลหรือสีเทาอมน้ำตาล บางตัวอาจจะมีคาดสีดำบริเวณหลังตามแนวขวางลำตัว กินสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และไข่ม้วนขนาดเล็กเป็นอาหาร จะออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบใต้โคนต้นไม้ บริเวณบ้านพักรับรองอธิการบดี

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.พ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

งูสายม่านพระอินทร์

ชื่อสามัญ

Common Bronzeback

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrelaphis pictus

ชื่อวงศ์

Colubrinae

ชื่ออันดับ

Squamata



งูสายม่านพระอินทร์ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ลำตัวเรียวยาว ตาโตเมื่อเทียบกับขนาดของหัว ลำตัวสีน้ำตาลริมฝีปากกลางและคางสีขาวครีม ท้องสีเหลืองอมเขียว เมื่อแผ่ส่วนคอและลำตัวจะเห็นผิวหนังสีฟ้า กินสัตว์ขนาดเล็กกว่า เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก กบ และเขียด เป็นอาหาร สามารถพบเจอได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิ่งบนกิ่งไม้ได้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูสายน่านเกล็ดไต้ตาใหญ่



ชื่อสามัญ

Mountain Bronzeback

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrelaphis subocularis

ชื่อวงศ์

Colubridae

ชื่ออันดับ

Squamata

งูสายน่านเกล็ดไต้ตาใหญ่ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ลักษณะเด่น คือ เกล็ดไต้ตามีขนาดใหญ่อยู่ 1 ชิ้น สีลำตัวเป็นสีบรอนซ์ เกล็ดท้องสีครีมยาวตลอดลำตัว จัดเป็นงูที่สีสันทสวยงาม มีความว่องไวในการเลื้อยเพื่อหลบหนีสิ่งรบกวน จะออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น กบ เขียด กิ้งก่า จิ้งเหลน และไขนก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบนอนพาดตัวเกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้ สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Indochinese Rat Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ptyas korros

ชื่อวงศ์

Colubrinae

ชื่ออันดับ

Squamata



งูสิงธรรมดา เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ลำตัวเรียวยาว ดวงตาโตมากเมื่อเทียบกับขนาดหัว ลำตัวสีน้ำตาลอมเหลือง หรือสีน้ำตาลเข้ม ส่วนหางยาวเรียว เกือบส่วนท้ายของลำตัวมีขนาดใหญ่และมีขอบสีดำ กินหนู หรือสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร โดยปกติหากินตามพื้นในตอนกลางวัน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะเลื้อยข้ามถนน เลื้อยหนีและขดตัวหลบอยู่ในหลุม

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 2 และ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูลายสาบคอแดง



ชื่อสามัญ

Red-necked Keelback

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Rhabdophis
subminiatus*

ชื่อวงศ์

Natricidae

ชื่ออันดับ

Squamata

งูลายสาบคอแดง เป็นงูขนาดกลาง มีพิษ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ลำตัวมีสีเขียวอมน้ำตาล มีแถบสีดำคาดจากตาไปยังขอบปาก บางตัวมีขอบเกล็ดเป็นสีเหลืองอ่อนและสีเทาเข้มจนถึงดำ ทำให้เห็นลวดลายหลังลำตัวเป็นจุดคล้าย ๆ ตารางหมากรุก มีลำคอสีแดงเห็นได้ชัดเจน หากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนส่วนใหญ่กินกบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก และแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเลื้อยอยู่ตามพื้นดิน ริมถนนใกล้ฟังหญ้าในตอนกลางวัน

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

Asian Sunbeam Snake,
Sunbeam Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xenopeltis unicolor

ชื่อวงศ์

Xenopeltidae

ชื่ออันดับ

Squamata



งูแสงอาทิตย์ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ลำตัวกลมยาว ทรงกระบอก หางสั้น หัวมีเกล็ดขนาดใหญ่ ใต้ท้องมีสีขาว ลำตัวด้านบนมีสีดำ เกล็ดเรียบเป็นมันวาว เมื่อสะท้อนแสง จะมีสีเหลือบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่องูแสงอาทิตย์ หากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และกินอาหารได้หลากหลาย ส่วนมากกินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะเลื้อยอยู่บนถนนในคืนฝนตก นอกจากนี้พบตามพื้นที่หญ้าใกล้แหล่งน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูลายสอสวน



ชื่อสามัญ

Yellow-spotted Keelback,
Common Keelback

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xenochrophis flavipunctatus

ชื่อวงศ์

Natricidae

ชื่ออันดับ

Squamata

งูลายสอสวน เป็นงูขนาดกลางไม่มีพิษ ลำตัวสีเทาปนเขียว หรือสีน้ำตาลปนเขียว มีเส้นคาดตาสีดำ 2 เส้นบริเวณใต้ตาและหางตาลงไปจรดกับริมฝีปากบน มีเส้นสีดำจากขากรรไกรบนลากไปบรรจบกัน บริเวณท้ายทอยเป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดสีดำขนาดใหญ่กระจายตามลำตัวด้านบน ออกหากินทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนโดยกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น ปลา กบ และเขียด เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบตามบ่อน้ำบริเวณริมบ่อที่มีกิ่งไม้แห้งและใบไม้ร่วง

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

ชื่อสามัญ

King Cobra

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ophiophagus hannah

ชื่อวงศ์

Elapidae

ชื่ออันดับ

Squamata



งูจงอาง เป็นงูขนาดใหญ่ มีพิษรุนแรงต่อระบบประสาท ลำตัวเป็นทรงกระบอกเรียวยาว มีความแปรผันของสีตัวสูงมาก งูจงอางที่พบตามภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่วนมากลำตัวจะมีสีเข้มจนเกือบดำ ในฤดูผสมพันธุ์วางไข่ งูเพศเมียจะใช้หางกวาดใบไม้มากองสุมทำรัง เมื่อวางไข่เสร็จแล้วแม่จะมีพฤติกรรมดูแลไข่จนกว่าลูกงูจะฟักออกมาเป็นตัว ออกหากินในตอนกลางวันหรือตอนพลบค่ำ ในช่วงที่แดดไม่ร้อนจัด โดยอาหารหลัก คือ งูขนาดเล็กกว่า บางครั้งกินงูจงอางด้วยกันเอง นอกจากนี้กินตะกวด ตุ๊กแก และหนู อีกด้วย ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบภายในพื้นที่บริเวณสวนเฟิร์นและบริเวณทางขึ้นดอยแม่่ม

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3 และ 5

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	VU												

งูเห่าไทย, งูเห่านา



ชื่อสามัญ
Monocle Cobra
ชื่อวิทยาศาสตร์
Naja kaouthia
ชื่อวงศ์
Elapidae
ชื่ออันดับ
Squamata

งูเห่าไทย หรืองูเห่านา เป็นงูพิษขนาดกลาง มีพิษร้ายแรง สมาชิกในวงศ์งูพิษเขี้ยวหน้า ลำตัวมีลักษณะเรียวยาว งูเห่าไทย ที่พบจากการสำรวจมีสีน้ำตาลอ่อน ออกหากินในเวลาพลบค่ำ โดยอาหารจะกินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด นก หนู และงูด้วยกันเองเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพายุก โดยพบขณะเลื้อยข้ามทางเดินในช่วงหัวค่ำ ซึ่งสองข้างทาง เป็นพงหญ้ารกทึบ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 4

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	LC												

งูกินதாகจุดดำ

ชื่อสามัญ
Black-spotted
Slug Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pareas macularis

ชื่อวงศ์
Pareatidae

ชื่ออันดับ
Squamata



งูกินதாகจุดดำ เป็นงูขนาดเล็ก มีตาโต ไม่มีพิษ ลักษณะลำตัวแบนตามแนวด้านข้าง ออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินหอยทากขนาดเล็กเป็นอาหาร จึงเป็นที่มาของงูกินทาก ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบตามพื้นป่ามีหญ้าขึ้นปกคลุมและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ พบริมถนนใกล้อ่างเก็บน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความชุ่มชื้นของหอยทาก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูปลิง



ชื่อสามัญ

Plumbeus Water Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypsiscopus plumbea

ชื่อวงศ์

Homalopsidae

ชื่ออันดับ

Squamata

งูปลิง เป็นงูน้ำที่มีขนาดเล็ก ไม่มีพิษ ลำตัวมีลักษณะสั้นป้อม ตัวมีสีเทาออกเขียวเข้ม หรือน้ำตาลเหลือง ออกลูกเป็นตัว ออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น กบ ไข่มก และลูกออด รวมทั้งปลาเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบตามพื้นดินที่มีน้ำท่วมขัง ใกล้ลำห้วย จากการสำรวจมักพบเห็นตัวขณะไต่หัวขึ้นมาจากผิวน้ำ พบเป็นประจำในบ่อน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

ชื่อสามัญ

Bocourt's Water Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์

Subsessor bocourti

ชื่อวงศ์

Homalopsidae

ชื่ออันดับ

Squamata



งูไซ เป็นงูน้ำที่มีขนาดใหญ่ ไม่มีพิษ ลำตัวมีลักษณะ
อ้วนกลม หางสั้น ลำตัวสีน้ำตาลไปจนถึงน้ำตาลแดง
ท้องสีเหลืองอ่อนมีลายแถบสีดำขวางทางด้านล่างลำตัว
ออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินกบ เขียด และสัตว์น้ำ
ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยพายุก โดยพบตามบ่อน้ำ

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	LC	-												

งูเหลือม



ชื่อสามัญ

Reticulated Python

ชื่อวิทยาศาสตร์

*Malayopython
reticulatus reticulatus*

ชื่อวงศ์

Pythonidae

ชื่ออันดับ

Squamata

งูเหลือม เป็นงูที่มีขนาดใหญ่ เชื่องช้า ไม่มีพิษ ลำตัวสีน้ำตาลเทา
อมเหลือง หัวมีเส้นยาวสีดำลากผ่านจากปลายจมูกถึงคอ และ
ส่วนหัวมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ออกหากินในเวลากลางวัน
โดยกินนกและสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดกลางได้ หากินได้ทั้งบนบกและในน้ำ ในมหาวิทยาลัย
พายุก โดยคณงานพบนอนอยู่บนถนนใกล้ลำห้วยตอนฝนตก

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
A	LC	-												

ชื่อสามัญ
Bengal Monitor
ชื่อวิทยาศาสตร์
Varanus bengalensis
ชื่อวงศ์
Varanidae
ชื่ออันดับ
Squamata



ตะกวด หรือแลน เป็นตะกวดขนาดใหญ่ คอยาว ขายาว ผิวนั่งหนา เกล็ดหยาบ มีจุดสีเหลืองกระจายทั่วบริเวณหลัง และขา ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเทา หรือสีเทา รูปร่างเป็นทรงรี เห็นได้ชัดเจน มักจะออกหากินในตอนกลางวันตามพื้นป่า โดยกินเศษซากไม้ใบไม้ แมลง ไล่เตียน หนอน และแมลงต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยคนงานพบขณะป็นต้นไม้

บริเวณที่พบ

จุดสำรวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์			เดือนที่สำรวจพบ											
พ.ร.บ.	ส.ผ.	IUCN	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค	LC	LC												

บรรณานุกรม

กองวิชาการธรรมชาตติวิทยา พิพิธภัณฑธรรมชาตติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแห่งชาติ (อพวช.).

2560. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในภาคเหนือ. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ พ้อยส์ จำกัด, กรุงเทพฯ.

คำรณ เลียดประดม, ยอดชาย ช่วยเงิน และจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน. _____. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ

สัตว์เลื้อยคลานในจังหวัดจันทบุรี. ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่างคู้กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี, จันทบุรี.

จารุจินต์ นภิตะภัก, กานต์ เลชะกุล, วชิระ สงวนสมบัติ, สมิตี สุติบุตร และกานต์ รัตนจุล. 2555. นกเมืองไทย.

พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์จำกัด, กรุงเทพฯ.

ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ชัยวัฒน์ ชินอุปราวัฒน์ และชูเกียรติ นวลศรี. คู่มือเหยี่ยวและนกอินทรี พิมพ์ครั้งที่

ที่ 1. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, กรุงเทพฯ.

ธัญญา จันอาจ. 2546. คู่มือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท ด้านสุทธาการพิมพ์

จำกัด, กรุงเทพฯ.

ประทีป ด้วงแค. 2550. ค้างคาวเมืองไทย: สำหรับการจำแนกชนิดในภาคสนาม. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปิยวรรณ นิยมวัน, ไพโรวัลย์ ศรีสม และปริญญา ภาวงศ์ชนะนันท์. 2560. หนังสือคู่มือภาคสนาม โครงการ

วิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว: สัตว์เลื้อยคลาน ห้วยขาแข้ง. ภาพพิมพ์, กรุงเทพฯ.

ไพบูลย์ จินตกุล. 2543. งูพิษในประเทศไทย. บริษัทพิมเณศ พริ้นติ้ง เซนเตอร์ จำกัด, กรุงเทพฯ.

พาร์, จอห์น. 2553. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง. สารคดี, กรุงเทพฯ.

ฟิลลิป ดี รวาร์ด, วิเชียร คงทอง, วิชา นรังศรี, สมิตี สุติบุตร. 2551. นกแหลมผักเบี้ย. มูลนิธิชัยพัฒนา,

กรุงเทพฯ.

มงคล วงศ์กาฬสินธุ์. 2547. เพื่อนดูนก นกชายเลนและนกทะเลในประเทศไทย. เอ. พี. พริ้นติ้ง กรุ๊ป

จำกัด, กรุงเทพฯ.

ยุวดี พลพิทักษ์. 2557. อาหารของสัตว์สะเทินน้ำ สะเทินบกบริเวณป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะวนศาสตร์, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย. 2555. รายชื่อนกในประเทศไทย. แหล่งที่มา: https://www.bcst.or.th/wp-content/uploads/2018/11/Checklist_ThaiBirds_2018_for_download.xlsx, 4 ธันวาคม 2561.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2558. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ เลื้อยคลานไทย เล่ม 1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). 2559. บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพสัตว์ สะเทินน้ำสะเทินบก. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ.

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า. 2562. บัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง. แหล่งที่มา: <http://www.dnp.go.th/wildlifednp/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/gov10.pdf>, 4 ธันวาคม 2561.

โอภาส ขอบเขตต์. 2542. นกในเมืองไทย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2544. นกในเมืองไทย เล่ม 2. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2543. นกในเมืองไทย เล่ม 3. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2544. นกในเมืองไทย เล่ม 4. สารคดี, กรุงเทพฯ.

โอภาส ขอบเขตต์. 2544. นกในเมืองไทย เล่ม 5. สารคดี, กรุงเทพฯ.

WWF-ประเทศไทย. 2558. คู่มือสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม ในผืนป่าตะวันตกตอนบน. บริษัท ดีดี มีเดีย พลัส จำกัด, กรุงเทพฯ.

Das, I. 2012. Snake of Thailand and Southeast Asia. John Beaufoy Publishing. England.

IUCN. 2019. The IUCN Red List of Threatened Species Version 2018-2. Available Source: <http://www.iucnredlist.org>, December 4, 2018.

รายชื่อสัตว์

ตารางที่ 1 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
1. กระรอกทองแดง	Pallas's Squirrel	<i>Callosciurus erythraeus</i>	-	LC	LC
2. กระเล็นขนปลายหูสั้น	Himalayan Striped Squirrel	<i>Tamiops mccllellandii</i>	-	LC	LC
3. กระจ๊อน	Indochinese Ground Squirrel	<i>Menetes berdmorei</i>	-	LC	LC
4. หนูบ้านท้องขาว	Oriental House Rat	<i>Rattus tanezumi</i>	-	LC	LC
5. หนูผีจิ๋ว	Etruscan Shrew	<i>Suncus etruscus</i>	-	LC	LC
6. ตุ่น, ดิง	Kloss's Mole	<i>Euroscaptor klossi</i>	-	VU	LC
7. ค้างคาวหน้ายาวใหญ่	Greater Long-nosed Fruit Bat	<i>Macroglossus sobrinus</i>	A	LC	LC
8. ค้างคาวหน้ายักซ์	Leaf-nosed Bat	<i>Hipposideros sp.</i>	A	-	-
9. กระแตเหนือ	Northern Treeshrew	<i>Tupaia belangeri</i>	-	LC	LC
10. นาก	Otter	<i>Aonyx sp.</i>	A	VU	VU
11. อีเห็นข้างลาย	Asian Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	-	LC	LC
12. หมาหริ่ง	Large-toothed Ferret Badger	<i>Melogale personata</i>	-	LC	LC
13. อ้นเล็ก	Bay Bamboo Rat	<i>Cannomys badius</i>	-	NT	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
1. เป็ดแดง	Lesser Whistling Duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	A	LC	LC
2. นกคุ่มอกดำ	Rain Quail	<i>Coturnix coromandelica</i>	A	NT	LC
3. ไก่ป่า	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	A	LC	LC
4. เป็ดผีเล็ก	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	-	LC	LC
5. นกยางไฟธรรมดา	Cinnamon Bittern	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	A	LC	LC
6. นกยางกรอกพันธุ์จีน	Chinese Pond Heron	<i>Ardeola bacchus</i>	A	LC	LC
7. นกกระสานวล	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	A	LC	LC
8. นกยางโตน้อย	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>	A	LC	LC
9. นกยางเปีย	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	A	LC	LC
10. เหยี่ยวผึ้ง	Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	A	LC	LC
11. เหยี่ยวรุ้ง	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	A	LC	LC
12. เหยี่ยวนกเขาหงอน	Crested Goshawk	<i>Accipiter trivirgatus</i>	A	LC	LC
13. เหยี่ยวนกเขาชิดรา	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	A	LC	LC
14. เหยี่ยวปีกแดง	Rufous-winged Buzzard	<i>Butastur liventer</i>	A	NT	LC
15. เหยี่ยวทะเลทราย ตะวันตก	Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	-	LC	LC
16. นกกวัก	White-breasted Waterhen	<i>Amauornis phoenicurus</i>	A	LC	LC
17. นกอัญชันหางดำ	Black-tailed Crake	<i>Porzana bicolor</i>	A	EN	-
18. นกอัญชันคิ้วขาว	White-browed Crake	<i>Porzana cinerea</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
19. นกอีล้ำ	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	ⓐ	LC	LC
20. นกคุ่มอกลาย	Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>	ⓐ	LC	LC
21. นกชายเลนน้ำจืด	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	ⓐ	LC	LC
22. นกพิราบป่า	Rock Pigeon	<i>Columba livia</i>	-	LC	LC
23. นกเขาไฟ	Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	ⓐ	LC	LC
24. นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง	Eastern Spotted Dove	<i>Spilopelia chinensis</i>	-	LC	LC
25. นกเขาเขียว	Common Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	-	LC	LC
26. นกเขาขาว	Zebra Dove	<i>Geopelia striata</i>	-	LC	LC
27. นกกระปูดใหญ่	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	ⓐ	LC	LC
28. นกกระปูดเล็ก	Lesser Coucal	<i>Centropus bengalensis</i>	ⓐ	LC	LC
29. นกบั้งรอกใหญ่	Green-billed Malkoha	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	ⓐ	LC	LC
30. นกกาเหว่า	Asian Koel	<i>Eudynamys scolopaceus</i>	ⓐ	LC	LC
31. นกคัคคูมรกต	Asian Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx maculates</i>	ⓐ	LC	LC
32. นกคัคคูสีม่วง	Violet Cuckoo	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	ⓐ	LC	LC
33. นกคัคคูลาย	Banded Bay Cuckoo	<i>Cacomantis sonneratii</i>	ⓐ	LC	LC
34. นกอีวาบตักแตน	Plaintive Cuckoo	<i>Cacomantis merulinus</i>	ⓐ	LC	LC
35. นกคัคคูแซงแซว	Square-tailed Drongo Cuckoo	<i>Surniculus lugubris</i>	ⓐ	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
36. นกฮูก, นกเค้ากู่	Collared Scops Owl	<i>Otus lettia</i>	ⓐ	LC	LC
37. นกเค้าหูยาวเล็ก	Oriental Scops Owl	<i>Otus sunia</i>	ⓐ	LC	LC
38. นกเค้าโมง, นกเค้าแมว	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	ⓐ	LC	LC
39. นกตบยุงหางยาว	Large-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus macrurus</i>	ⓐ	LC	LC
40. นกแอ่นฟ้าหงอน	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronate</i>	ⓐ	LC	LC
41. นกแอ่นตาล	Asian Palm Swift	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	ⓐ	LC	LC
42. นกแอ่นบ้าน	House Swift	<i>Apus nipalensis</i>	ⓐ	LC	LC
43. นกกะเต็นอกขาว	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	ⓐ	LC	LC
44. นกกะเต็นหัวดำ	Black-capped Kingfisher	<i>Halcyon pileata</i>	ⓐ	LC	LC
45. นกกะเต็นน้อย หลังสีน้ำเงิน	Blue-eared Kingfisher	<i>Alcedo meninting</i>	ⓐ	LC	LC
46. นกกะเต็นน้อย ธรรมดา	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	ⓐ	LC	LC
47. นกจาบคาเครา น้ำเงิน	Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i>	ⓐ	LC	LC
48. นกจาบคาเล็ก	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	ⓐ	LC	LC
49. นกจาบคาหัวสีส้ม	Chestnut-headed Bee-eater	<i>Merops leschenaultia</i>	ⓐ	LC	LC
50. นกกระรางหัวขวาน	Eurasian Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	ⓐ	LC	LC
51. นกโพระดกธรรมดา	Lineated Barbet	<i>Psilopogon lineatus</i>	ⓐ	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
52. นกโพระดกหูเขียว	Green-eared Barbet	<i>Psilopogon faiostriatus</i>	A	LC	LC
53. นกโพระดกคอสีฟ้า	Blue-throated Barbet	<i>Psilopogon asiaticus</i>	A	LC	LC
54. นกตีทอง	Coppersmith Barbet	<i>Psilopogon haemacephalus</i>	A	LC	LC
55. นกหัวขวานจิ้งจิวขาว	White-browed Piculet	<i>Sasia ochracea</i>	A	LC	LC
56. นกหัวขวานด่างแคระ	Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Yungipicus canicapillus</i>	A	LC	LC
57. นกหัวขวานสีตาล	Rufous Woodpecker	<i>Micropternus brachyurus</i>	A	LC	LC
58. เหยี่ยวเพเรกริน	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	A	NT	LC
59. นกกะลิง	Grey-headed Parakeet	<i>Psittacula finschii</i>	A	LC	NT
60. นกเขนน้อยปีกแถบขาว	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	A	LC	LC
61. นกแอ่นพง	Ashy Woodswallow	<i>Artamus fuscus</i>	A	LC	LC
62. นกขมิ้นน้อยธรรมดา	Common lora	<i>Aegithina tiphia</i>	A	LC	LC
63. นกขมิ้นน้อยปีกสีเขียว	Great lora	<i>Aegithina lafresnayeii</i>	A	LC	LC
64. นกพญาไฟคอเทา	Grey-chinned Minivet	<i>Pericrocotus solaris</i>	A	LC	-
65. นกพญาไฟแม่สะเรียง	Short-billed Minivet	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	A	LC	LC
66. นกพญาไฟพันธุ์เหนือ	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
67. นกพญาไฟใหญ่	Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus speciosus</i>	ⓐ	LC	LC
68. นกพญาไฟสีเทา	Ashy Minivet	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	ⓐ	LC	LC
69. นกพญาไฟสีกุหลาบ	Rosy Minivet	<i>Pericrocotus roseus</i>	ⓐ	LC	LC
70. นกอีเสือสีน้ำตาล	Brown Shrike	<i>Lanius cristatus</i>	ⓐ	LC	LC
71. นกอีเสือหลังแดง	Burmese Shrike	<i>Lanius collurioides</i>	ⓐ	LC	LC
72. นกอีเสือหัวดำ	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	ⓐ	LC	LC
73. นกขมิ้นท้ายทอยดำ	Black-naped Oriole	<i>Oriolus chinensis</i>	ⓐ	LC	LC
74. นกแซงแซวหางปลา	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	ⓐ	LC	LC
75. นกแซงแซวสีเทา	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	ⓐ	LC	LC
76. นกแซงแซวปากกา	Crow-billed Drongo	<i>Dicrurus annectens</i>	ⓐ	LC	LC
77. นกแซงแซว เล็กเหลือบ	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	ⓐ	LC	LC
78. นกแซงแซว หางบ่วงเล็ก	Lesser Racquet-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	ⓐ	LC	LC
79. นกแซงแซวหงอนขน	Hair-crested Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>	ⓐ	LC	LC
80. นกแซงแซว หางบ่วงใหญ่	Greater Racquet-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>	ⓐ	LC	LC
81. นกอีแพรดคอขาว	White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	ⓐ	LC	LC
82. นกจับแมลงจุกดำ	Black-naped Monarch	<i>Hypothymis azurea</i>	ⓐ	LC	LC
83. นกแซวสวรรค์	Blyth's Paradise-fly- catcher	<i>Terpsiphone affinis</i>	ⓐ	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
84. นกกาแวน	Racquet-tailed Treepie	<i>Crypsirina temia</i>	A	LC	LC
85. นกจับแมลงหัวเทา	Grey-headed Canary-flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	A	LC	LC
86. นกปรอดทอง	Black-headed Bulbul	<i>Pycnonotus atriceps</i>	A	LC	LC
87. นกปรอดเหลืองหัวจุก	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus flaviventris</i>	A	LC	LC
88. นกปรอดหัวโขน	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	A	NT	LC
89. นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง	Brown-breasted Bulbul	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	A	LC	LC
90. นกปรอดหัวสีเขม่า	Sooty-headed Bulbul	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	A	LC	LC
91. นกปรอดคอลาย	Stripe-throated Bulbul	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	A	LC	LC
92. นกปรอดสวน	Streak-eared Bulbul	<i>Pycnonotus conradi</i>	A	LC	LC
93. นกปรอดเล็กตาขาว	Grey-eyed Bulbul	<i>Iole propinqua</i>	A	LC	LC
94. นกปรอดเทาหัวขาว	White-headed Bulbul	<i>Cerasophila thompsoni</i>	A	LC	LC
95. นกนางแอ่นบ้าน	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	A	LC	LC
96. นกนางแอ่นลาย	Striated Swallow	<i>Cecropis striolata</i>	A	LC	-
97. นกกระจ๊อยคอขาว	Yellow-bellied Warbler	<i>Abroscopus superciliaris</i>	A	LC	LC
98. นกกระจัดสีคล้ำ	Dusky Warbler	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	A	LC	LC
99. นกกระจัดปากหนา	Radde's Warbler	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	A	LC	LC
100. นกกระจัดพันธุ์จีน	Chinese Leaf Warbler	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
101. นกกระจิตธรรมดา	Yellow-browed Leaf Warbler	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A	LC	LC
102. นกกระจิตหัวโลกเหนือ	Arctic Leaf Warbler	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	LC	LC
103. นกกระจิตเขียวปีกสองแถบ	Two-barred Leaf Warbler	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	A	LC	LC
104. นกกระจิตหัวมงกุฎ	Eastern Crowned Leaf Warbler	<i>Phylloscopus coronatus</i>	A	LC	LC
105. นกกระจิตหางขาวใหญ่	Claudia's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus claudiae</i>	A	LC	LC
106. นกกระจอยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง	Bianchi's Warbler	<i>Seicercus valentine</i>	A	LC	LC
107. นกพงปากหนา	Thick-billed อWarbler	<i>Arundinax aedon</i>	A	LC	LC
108. นกกระजิบหญ้าสีข้างแดง	Rufescent Prinia	<i>Prinia rufescens</i>	A	LC	LC
109. นกกระจิบหญ้าสีเขียว	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	A	LC	LC
110. นกกระจิบธรรมดา	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	A	LC	LC
111. นกกระจิบคอดำ	Dark-necked Tailorbird	<i>Orthotomus atrogularis</i>	A	LC	LC
112. นกกระวังไพรปากเหลือง	White-browed Scimitar Babbler	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
113. นกกินแมลงคอเทา	Grey-throated Babbler	<i>Stachyris nigriceps</i>	A	LC	LC
114. นกกินแมลง อกเหลือง	Pin-striped Tit Babbler	<i>Mixornis gularis</i>	A	LC	LC
115. นกจาบดินนอกลาย	Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i>	A	LC	LC
116. นกกินแมลงป่า อกสีน้ำตาล	Buff-breasted Babbler	<i>Pellorneum tickelli</i>	A	LC	LC
117. นกกระรางสร้อย คอเล็ก	Lesser Necklaced Laugh- ingthrush	<i>Garrulax monileger</i>	A	LC	LC
118. นกกระรางสร้อย คอใหญ่	Greater Necklaced Laughingthrush	<i>Garrulax pectoralis</i>	A	LC	LC
119. นกกระรางคอดำ, นกชอฮู้	Black-throated Laughingthrush	<i>Dryonastes chinensis</i>	A	NT	LC
120. นกกินแมลง ตาเหลือง	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>	A	LC	LC
121. นกแว่นตาขาว สีข้างแดง	Chestnut-flanked White-eye	<i>Zosterops erythropleurus</i>	A	LC	LC
122. นกแว่นตาขาว สีทอง	Indian White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	A	LC	LC
123. นกไต่ไม้หน้า ผากอำมะหยี่	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	A	LC	LC
124. นกเอี้ยงหงอน	White-vented Myna	<i>Acridotheres grandis</i>	A	LC	LC
125. นกเอี้ยงสาริกา	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
126. นกกิ่งโครงคอดำ	Black-collared Myna	<i>Gracupica nigricollis</i>	⚠	LC	LC
127. นกเอี้ยงต่าง	Asian Pied Myna	<i>Gracupica contra</i>	⚠	LC	LC
128. นกกิ่งโครงกลบ แก้มสีน้ำตาลแดง	Chestnut-cheeked Starling	<i>Agropsar philippensis</i>	⚠	LC	LC
129. นกกิ่งโครงกลบ หัวเทา	Chestnut-tailed Starling	<i>Sturnia malabarica</i>	⚠	LC	LC
130. นกกางเขนบ้าน	Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>	⚠	LC	LC
131. นกกางเขนดง	White-rumped Shama	<i>Kittacincla malabarica</i>	⚠	LC	LC
132. นกจับแมลงสีคล้ำ	Dark-sided Flycatcher	<i>Muscicapa sibirica</i>	⚠	LC	LC
133. นกจับแมลง สีน้ำตาล	Asian Brown Flycatcher	<i>Muscicapa dauurica</i>	⚠	LC	LC
134. นกจับแมลง คือน้ำตาลแดง	Hill Blue Flycatcher	<i>Cyornis banyumas</i>	⚠	LC	LC
135. นกจับแมลง อกส้มทองชา	Indochinese Blue Flycatcher	<i>Cyornis sumatrensis</i>	⚠	LC	LC
136. นกจับแมลงสีฟ้า	Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i>	⚠	LC	LC
137. นกเอี้ยงถ้ำ	Blue Whistlingthrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	⚠	LC	LC
138. นกจับแมลงคอแดง	Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>	⚠	LC	LC
139. นกกระเบื้องผา	Blue Rockthrush	<i>Monticola solitaries</i>	⚠	LC	LC
140. นกยอดหญ้าหัวดำ	Eastern Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>	⚠	LC	-
141. นกยอดหญ้าสีดำ, นกขี้หมา	Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	⚠	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
142. นกยอดหญ้าสีเทา	Grey Bushchat	<i>Saxicola ferreus</i>	⚠	LC	LC
143. นกเขียวก้านทอง หน้าผากสีทอง	Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i>	⚠	LC	LC
144. นกกาฝากกันเหลือง	Yellow-vented Flowerpecker	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	⚠	LC	LC
145. นกกาฝากสีเรียบ	Plain Flowerpecker	<i>Dicaeum minullum</i>	⚠	LC	LC
146. นกสีชมพูสวน	Scarlet-backed Flowerpecker	<i>Dicaeum cruentatum</i>	⚠	LC	LC
147. นกกินปลี แก้มสีทับทิม	Ruby-cheeked Sunbird	<i>Chalcoparia singalensis</i>	⚠	LC	LC
148. นกกินปลีดำม่วง	Purple Sunbird	<i>Cinnyris asiaticus</i>	⚠	LC	LC
149. นกกินปลีอกเหลือง	Olive-backed Sunbird	<i>Cinnyris jugularis</i>	⚠	LC	LC
150. นกกินปลีคอแดง	Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>	⚠	LC	LC
151. นกปลีกล้วยเล็ก	Little Spiderhunter	<i>Arachnothera longirostra</i>	⚠	LC	LC
152. นกปลีกล้วยลาย	Streaked Spiderhunter	<i>Arachnothera magna</i>	⚠	LC	LC
153. นกกระจอกบ้าน	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	-	LC	LC
154. นกกระจาบทธรรมดา	Baya Weaver	<i>Ploceus philippinus</i>	⚠	LC	LC
155. นกกระตีด ตะโพกขาว	White-rumped Munia	<i>Lonchura striata</i>	⚠	LC	LC
156. นกกระตีดขี้หมู	Scaly-breasted Munia	<i>Lonchura punctulata</i>	⚠	LC	LC
157. นกเด้าลมหลังเทา	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	⚠	LC	LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
158. นกอุ้มบาตร	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	⛔	LC	LC
159. นกเค้าดินทุ่งเล็ก	Paddyfield Pipit	<i>Anthus rufulus</i>	⛔	LC	LC
160. นกเค้าดินสวน	Olive-backed Pipit	<i>Anthus hodgsoni</i>	⛔	LC	LC
161 อีกา	Eastern Jungle Crow	<i>Corvus levillantii</i>	⛔	LC	LC

ตารางที่ 3 รายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
1. อิงชาคำ	Beautiful Pygmy Frog	<i>Microhyla pulchra</i>	-	LC	LC
2. อิงแม่หนาว	Pegu Rice Frog	<i>Microhyla berdmorei</i>	-	LC	LC
3. อิงน้ำเต้า	Ornate Chorus Frog	<i>Microhyla mukhlesuri</i>	-	LC	-
4. อิงข้างดำ	Dark-sided Chorus Frog	<i>Microhyla heymonsi</i>	-	LC	LC
5. อิงอ่างบ้าน	Malaysian Narrowmouth Toad	<i>Kaloula pulchra</i>	-	LC	LC
6. อิงลายแต้ม, อิงลายเลอะ	Butler's Pigmy Frog	<i>Microhyla butleri</i>	-	LC	-
7. อิงหลังจุด	Inornate chorus frog	<i>Micryletta inornata</i>	-	LC	LC
8. อิงกรายหนังปุ่ม	Olive Crawl Frog	<i>Leptotalax pelodytoides</i>	-	LC	LC
9. กบกา	Limborg's Frog	<i>Limnonectes limborgi</i>	-	LC	LC
10. กบหนอง	Grass Frog, Rice Field	<i>Fejervarya limnocharis</i>	-	LC	LC

ตารางที่ 3 รายชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
11. กบหงอน	Capped Frog	<i>Limnonectes gyldenstolpei</i>	-	LC	LC
12. เขียดทราย, เขียดหลังปุ่มที่ราบ	Marten's Puddle Frog	<i>Occidozyga martensii</i>	-	LC	LC
13. คางคกบ้าน	Asian common toad	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>	-	LC	LC
14. เขียดบัว, เขียดจิก	Green paddy frog	<i>Hylarana erythraea</i>	-	LC	LC
15. กบนา	East Asian Bullfrog	<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>	-	LC	LC
16. ปาดบ้าน	Four-lined Tree Frog	<i>Polypedates leucomystax</i>	-	LC	LC
17. ปาดแคระป่า	Dwarf Bushfrog	<i>Philautus parvulus</i>	-	LC	-

ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
1. จิ้งเหลนบ้าน	Common Sun Skink	<i>Eutropis multifasciatus</i>		LC	-
2. จิ้งเหลนหลากหลาย	Bronze Mabuya, Bronze Skink	<i>Eutropis macularius</i>	-	LC	-
3. กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าหัวแดง	Common Garden Lizard	<i>Calotes versicolor</i>	A	LC	-
4. กิ้งก่าหัวสีฟ้า	Blue crested lizard	<i>Calotes mystaceus</i>	-	LC	LC
5. ตุ๊กแกบ้าน	Common House Gecko	<i>Gekko gecko</i>	A	LC	LC

ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ชื่อไทย	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สถานภาพการอนุรักษ์		
			พ.ร.บ.	สผ.	IUCN
6. จิ้งจกบ้านหางหนาม	Spiny-tailed House Gecko	<i>Hemidactylus frenatus</i>	-	LC	LC
7. จิ้งจกบ้านหางแบน	Common Frilled Gecko	<i>Hemidactylus platyurus</i>	-	LC	-
8. งูปีแก้วลายแต้ม	Banded Kukri Snake	<i>Oligodon fasciolatus</i>	-	LC	LC
9. งูสายน่านพระอินทร์	Common Bronzeback	<i>Dendrelaphis pictus</i>	-	LC	-
10. งูสายน่านเกล็ดใต้ ตาใหญ่	Mountain Bronzeback	<i>Dendrelaphis subocularis</i>	-	LC	LC
11. งูสิงธรรมชาติ, งูเห่าตาลาน	Indochinese Rat Snake	<i>Ptyas korros</i>	-	LC	-
12. งูลายسابคอแดง	Red-necked Keelback	<i>Rhabdophis subminiatus</i>	A	LC	LC
13. งูแสงอาทิตย์	Sunbeam Snake	<i>Xenopeltis unicolor</i>	-	LC	LC
14. งูลายสอสวน	Common Keelback	<i>Xenochrophis flavipunctatus</i>	A	LC	LC
15. งูจงอาง	King Cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>	-	LC	VU
16. งูเห่าไทย, งูเห่านา	Monocle Cobra	<i>Naja kaouthia</i>	A	LC	LC
17. งูกินทากจุดดำ	Black-spotted Slug Snake	<i>Pareas macularis</i>	-	LC	-
18. งูปลิ้ง	Plumbeus Water Snake	<i>Hypsiscopus plumbea</i>	-	LC	-
19. งูไซ	Bocourt's Water Snake	<i>Subessor bocourti</i>	-	LC	-
20. งูเหลือม	Reticulated Python	<i>Malayopython reticulatus reticulatus</i>	A	LC	-
21. ตะกวด, แล่น	Bengal Monitor	<i>Varanus bengalensis</i>	A	LC	LC
22. เต่าใบไม้พม่า	Burmese Leaf Turtle	<i>Cyclemys oldhami</i>	-	NT	-

ดัชนีชื่อไทย

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กระแตเหินือ 36
กระจ๊อน, กระรอกดินข้างลาย 31
กระรอกทองแดง 29
กระเล็นขนปลายหูสั้น 30
ค่างคาวหน้ายักษ์ sp. 35
ค่างคาวหน้ายาวใหญ่ 34
ตุ่น, ตึง 28
นาก sp. 37
หมาหริ่ง 38
หนูบ้านทองขาว 32
หนูผีจิ๋ว 33
อ้น 26
อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา 39

นก

ไก่อ่า 46
กระจอกบ้าน 196
กระจอยคอกขาว 140
กระจอยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง 149
กระจาบธรรมดา 197
กระจัดชั่วโลกเหนือ 145
นกกระจัดเขียวปีกสองแถบ 146
นกกระจัดธรรมดา 144

กระจัดปากหนา 142
นกกระจัดพันธุ์จีน 143
กระจัดสีคล้ำ 141
กระจัดหัวมงกุฎ 147
กระจัดหางขาวใหญ่ 148
กระจับคอดำ 154
กระจับธรรมดา 153
กระจับหญ้าสีข้างแดง 151
กระจับหญ้าสีเขียว 152
กระต๊อขี้หมู 199
กระต๊อตะโพกขาว 198
กระเบื้องผา 182
กระปูดเล็ก 71
กระปูดใหญ่ 70
กระสานวล 50
ก๊วก 59
กะเต็นน้อยธรรมดา 89
กะเต็นน้อยหลังสีเงิน 88
กะเต็นหัวดำ 87
กะเต็นอกขาว 86
กะรางคอดำ, ซอฮู้ 162
กะรางสร้อยคอเล็ก 160
กะรางสร้อยคอใหญ่ 161
กะรางหัวขวาน 93
กะลิง 42

กางเขนดง 174
 กางเขนน้อยปีกแถบขาว 102
 กางเขนบ้าน 173
 กาฝากกันเหลือง 187
 กาฝากสีเรียบ 188
 กาแวน 126
 กาเหว่า 73
 กิ่งโครกเกลบแก้มสีน้ำตาลแดง 171
 กิ่งโครกเกลบหัวเทา 172
 กิ่งโครกคอดำ 169
 กิณปल्लीแก้มสีทับทิม 190
 กิณปल्लीคอแดง 193
 กิณปल्लीดำม่วง 191
 กิณปल्लीอกเหลือง 192
 กิณแมลงคอเทา 156
 กิณแมลงตาเหลือง 161
 กิณแมลงปากอกสีน้ำตาล 176
 กิณแมลงอกเหลือง 157
 ขมิ้นท้ายทอยดำ 115
 ขมิ้นน้อยธรรมดา 104
 ขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ 105
 เขาเขียว 68
 เขาขวา 69
 เขาไฟ 66
 เขาใหญ่, เขาหลวง 67
 เขียวก้านตองหน้าผากสีทอง 186
 คัคคูแข่งแซว 78
 คัคคูมรกต 74
 คัคคูลาย 76

คัคคูสีม่วง 75
 คุ่มอกดำ 45
 คุ่มอกลาย 63
 เค้าโม่ง, เค้าแมว 81
 เค้าหุยาวเล็ก 80
 จับแมลงคอแดง 181
 จับแมลงคอน้ำตาลแดง 177
 จับแมลงจุกดำ 124
 จับแมลงสีคล้ำ 175
 จับแมลงสีน้ำตาล 176
 จับแมลงสีฟ้า 179
 จับแมลงหัวเทา 128
 จับแมลงอกส้มท้องขาว 178
 จาบคาเคราน้ำเงิน 90
 จาบคาเล็ก 91
 จาบคาหัวสีส้ม 92
 จาบดินอกลาย 158
 ชายเลนน้ำจืด 64
 แขงแซวปากกา 118
 แขงแซวเล็กเหลือง 119
 แขงแซวสีเทา 117
 แขงแซวหงอนขน 121
 แขงแซวหางบ่วงเล็ก 120
 แขงแซวหางบ่วงใหญ่ 122
 แขงแซวหางปลา 116
 แซวสวรรค์ 125
 เต้าดินทุ่งเล็ก 202
 เต้าดินสวน 203
 เต้าลมหลังเทา 200

ดบยุงหางยาว 82
 ดีทอง 97
 ไต้ไม้หน้าผากกำมะหยี่ 166
 นางแอ่นบ้าน 85
 นางแอ่นลาย 139
 บั้งรอกใหญ่ 72
 พรอดคอลาย 134
 พรอดทอง 129
 พรอดเทาหัวขาว 137
 พรอดเล็กตาขาว 136
 พรอดสวน 135
 พรอดหัวโขน 131
 พรอดหัวโขนกันเหลือง 132
 พรอดหัวสีเขม่า 133
 พรอดเหลืองหัวจุก 130
 ปลีกกล้วยลาย 195
 ปลีกกล้วยเล็ก 194
 เป็ดผีเล็ก 47
 พงปากหนา 150
 พญาไฟคอกเทา 106
 พญาไฟพันธุ์เหนือ 108
 พญาไฟแม่สะเรียง 107
 พญาไฟสีกุหลาบ 111
 พญาไฟสีเทา 110
 พญาไฟใหญ่ 109
 พิราบป่า 65
 โพระดกคอสีฟ้า 96
 โพระดกธรรมดา 94
 โพระดกหูเขียว 95

ยอดหญ้าสีดำ, ขี้หมา 184
 ยอดหญ้าสีเทา 185
 ยอดหญ้าหัวดำ 183
 ยางกรอกพันธุ์จีน 49
 ยางโขนน้อย 51
 ยางเปีย 52
 ยางไพธรรมดา 48
 ระวังไพรปากเหลือง 155
 แวนตาขาวสีข้างแดง 164
 แวนตาขาวสีทอง 165
 สีชมพูสวน 189
 หัวขวานจิ้งจิวขาว 98
 หัวขวานด่างแคะ 99
 หัวขวานสีตาล 100
 อัญชันคิ้วขาว 61
 อัญชันหางดำ 60
 อีกา 127
 อีแพรดคอกขาว 123
 อีล้า 62
 อีวาบตักแตน 77
 อีเสื้อสีน้ำตาล 112
 อีเสื้อหลังแดง 113
 อีเสื้อหัวดำ 114
 อัมบาตร 201
 เอี้ยงดำ 170
 เอี้ยงถ้ำ 180
 เอี้ยงสาริกา 168
 เอี้ยงหงอน 167
 แอนตาล 84

แอ่นบ้าน 85
แอ่นพง 103
แอ่นฟ้าหงอน 83

ฮูก, เค้ากู่ 79
เป็ดแดง 44
เหยี่ยวนกเขาชิดรา 56
เหยี่ยวนกเขาหงอน 55
เหยี่ยวปีกแดง 57
เหยี่ยวผึ้ง 53
เหยี่ยวเพเรกริน 101
เหยี่ยวรุ้ง 54

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

กบกา 214
กบนา 220
กบหงอน 216
กบหนอง 215
เขียดทราย, เขียดหลังปุมที่ราบ 217
เขียดบัว, เขียดจิก 219
คางคกบ้าน 218
ปาดแคะป่า 222
ปาดบ้าน 221
อึ่งกรายหนังปุม 213
อึ่งขาคำ 206
อึ่งข้างดำ 209
อึ่งน้ำเต้า 207
อึ่งแม่หนาว 207
อึ่งลายแต้ม, อึ่งลายเลอะ 211

อึ่งหลังจุด, อึ่งหลังขีด 212
อึ่งอ่างบ้าน 210

สัตว์เลื้อยคลาน

กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าหัวแดง 227
กิ้งก่าหัวสีฟ้า 228
งูกินதாகจุดดำ 241
งูจงอาง 239
งูไซ 243
งูปลิง 242
งูปี้แก้วลายแต้ม 232
งูลายสอสวน 238
งูลายสาคอแดง 236
งูสาม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ 234
งูสาม่านพระอินทร์ 233
งูสิงธรรมดา, งูเห่าตาลาน, งูสิงอ้อย 235
งูแสงอาทิตย์ 237
งูเหลือม 244
งูเห่าไทย, งูเห่านา 240
จิ้งจกบ้านหางแบน 231
จิ้งจกบ้านหางหนาม 230
จิ้งเหลนบ้าน 225
จิ้งเหลนหลากลาย 226
ตะกวด, แลน 245
ตุ๊กแกบ้าน 229
เต่าใบไม้พม่า 224

ดัชนีชื่อสามัญ

Mammals

Asian Palm Civet 39
Bay Bamboo Rat 26, 27
Etruscan Shrew 33
Greater Long-nosed Fruit Bat 34
Himalayan Striped Squirrel 30
Indochinese Ground Squirrel 31
Kloss's Mole 28
Large-toothed Ferret Badger 38
Leaf-nosed Bat 35
Northern Treeshrew 36
Oriental House Rat 32
Otter 37
Pallas's Squirrel 29

Birds

Arctic Leaf Warbler 145
Ashy Drongo 117
Ashy Minivet 110
Ashy Woodswallow 103
Asian Barred Owlet 81
Asian Brown Flycatcher 176
Asian Emerald Cuckoo 74
Asian Koel 73

Asian Palm Swift 84
Asian Pied Myna 170
Banded Bay Cuckoo 76
Barn Swallow 138
Barred Buttonquail 63
Bar-winged Flycatcher-shrike 102
Baya Weaver 197
Bianchi's Warbler 149
Black Drongo 116
Black-capped Kingfisher 87
Black-collared Myna 169
Black-crested Bulbul 130
Black-headed Bulbul 129
Black-naped Monarch 124
Black-naped Oriole 115
Black-tailed Crake 60
Black-throated Laughingthrush 162
Blue Rockthrush 182
Blue Whistlingthrush 180
Blue-bearded Bee-eater 90
Blue-eared Kingfisher 88
Blue-throated Barbet 96
Blyth's Paradise-flycatcher 125
Bronzed Drongo 119
Brown Shrike 112

Brown-breasted Bulbul 132
Buff-breasted Babbler 159
Burmese Shrike 113
Chestnut-cheeked Starling 171
Chestnut-flanked White-eye 164
Chestnut-headed Bee-eater 92
Chestnut-tailed Starling 172
Chinese Leaf Warbler 143
Chinese Pond Heron 49
Cinnamon Bittern 48
Claudia's Leaf Warbler 148
Collared Scops Owl 79
Common Emerald Dove 68
Common Iora 104
Common Kingfisher 89
Common Moorhen 62
Common Myna 168
Common Tailorbird 153
Coppersmith Barbet 97
Crested Goshawk 55
Crested Serpent Eagle 54
Crested Treeswift 83
Crimson Sunbird 193
Crow-billed Drongo 118
Dark-necked Tailorbird 154
Dark-sided Flycatcher 175
Dusky Warbler 141
Eastern Crowned Leaf Warbler 147
Eastern Jungle Crow 127

Eastern Spotted Dove 67
Eastern Stonechat 183
Eurasian Hoopoe 93
Eurasian Tree Sparrow 196
Golden-fronted Leafbird 186
Great Iora 105
Greater Coucal 70
Greater Necklaced Laughingthrush 161
Greater Racquet-tailed Drongo 122
Green Bee-eater 91
Green-billed Malkoha 72
Green-eared Barbet 95
Grey Bushchat 185
Grey Heron 50
Grey Wagtail 200
Grey-capped Pygmy Woodpecker 99
Grey-chinned Minivet 106
Grey-eyed Bulbul 136
Grey-headed Canary-flycatcher 128
Grey-headed Parakeet 42
Grey-throated Babbler 156
Hair-crested Drongo 121
Hill Blue Flycatcher 177
House Swift 85
Oriental White-eye 165
Indochinese Blue Flycatcher 178
Intermediate Egret 51
Large-tailed Nightjar 82
Lesser Coucal 71

Lesser Necklaced Laughingthrush 160	Rock Pigeon 65
Lesser Racquet-tailed Drongo 120	Rosy Minivet 111
Lesser Whistling Duck 44	Ruby-cheeked Sunbird 190
Lineated Barbet 94	Rufescent Prinia 151
Little Egret 52	Rufous Woodpecker 100
Little Grebe 47	Rufous-winged Buzzard 57
Little Spiderhunter 194	Scaly-breasted Munia 199
Long-tailed Minivet 108	Scarlet Minivet 109
Long-tailed Shrike 114	Scarlet-backed Flowerpecker 189
Olive-backed Pipit 203	Shikra 56
Olive-backed Sunbird 192	Short-billed Minivet 107
Oriental Honey-buzzard 53	Sooty-headed Bulbul 133
Oriental Magpie Robin 173	Square-tailed Drongo Cuckoo 78
Oriental Scops Owl 80	Streak-eared Bulbul 135
Paddyfield Pipit 202	Streaked Spiderhunter 195
Peregrine Falcon 101	Striated Swallow 139
Pied Bushchat 184	Stripe-throated Bulbul 134
Pin-striped Tit Babbler 157	Taiga Flycatcher 181
Plain Flowerpecker 188	Thick-billed Warbler 150
Plain Prinia 152	Two-barred Leaf Warbler 146
Plaintive Cuckoo 77	Velvet-fronted Nuthatch 166
Puff-throated Babbler 158	Verditer Flycatcher 179
Purple Sunbird 191	Violet Cuckoo 75
Racquet-tailed Treepie 126	White Wagtail 201
Radde's Warbler 142	White-breasted Waterhen 59
Rain Quail 45	White-browed Crake 61
Red Collared Dove 66	White-browed Piculet 98
Red Junglefowl 46	White-browed Scimitar Babbler 155
Red-whiskered Bulbul 131	White-headed Bulbul 137

White-rumped Munia 198
White-rumped Shama 174
White-throated Fantail 123
White-throated Kingfisher 86
White-vented Myna 167
Wood Sandpiper 64
Yellow-bellied Warbler 140
Yellow-browed Leaf Warbler 144
Yellow-eyed Babbler 163
Yellow-vented Flowerpecker 187
Zebra Dove 69

Amphibians

Asian common toad,
 Black-spined toad 218
Beautiful Pygmy Frog,
 Marbled Pigmy Frog 206
Butler's Pigmy Frog 211
Capped Frog 216
Dwarf Bushfrog 222
Dark-sided Chorus Frog 209
East Asian Bullfrog 220
Four-lined Tree Frog 221
Grass Frog, Rice Field 215
Green paddy frog, Red-eared frog 219
Inornate chorus frog 212
Limborg's Frog 214
Malaysian Narrowmouth Toad 210
Marten's Puddle Frog 217

Olive Crawl Frog 213
Ornate Chorus Frog 208
Pegu Rice Frog, Berdmore's
 Narrow-mouthed Frog 207

Reptiles

Banded Kukri Snake 232
Bengal Monitor 245
Black-spotted Slug Snake 241
Blue crested lizard 228
Bronze Mabuya, Bronze Skink 226
Burmese Leaf Turtle 224
Common Bronzeback 233
Common Frilled Gecko 231
Common Garden Lizard 227
Common House Gecko 229
Common Keelback,
 Yellow-spotted Keelback, 238
Common Sun Skink 225
Indochinese Rat Snake 235
King Cobra 239
Monocle Cobra 240
Mountain Bronzeback 234
Plumbeus Water Snake 242
Red-necked Keelback 236
Reticulated Python 244
Spiny-tailed House Gecko 230
Sunbeam Snake,
 Asian Sunbeam Snake 237

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

Mammals

Aonyx sp. 37
Callosciurus erythraeus 29
Cannomys badius 26, 27
Euroscaptor klossi 28
Hipposideros sp. 35
Macroglossus sobrinus 34
Melogale personata 38
Menetes berdmorei 31
Paradoxurus hermaphrodites 39
Rattus tanezumi 32
Suncus etruscus 33
Tamias mccllellandii 30
Tupaia belangeri 36

Birds

Abroscopus superciliaris 140
Accipiter badius 56
Accipiter trivirgatus 55
Acridotheres grandis 167
Acridotheres tristis 168
Aegithina lafresnayei 105
Aegithina tiphia 104
Aethopyga siparaja 193

Agropsar philippensis 171
Alcedo atthis 89
Alcedo meninting 88
Amauornis phoenicurus 59
Anthus hodgsoni 203
Anthus rufulus 202
Apus nipalensis 85
Arachnothera longirostra 194
Arachnothera magna 195
Ardea cinerea 50
Ardea intermedia 51
Ardeola bacchus 49
Artamus fuscus 103
Arundinax aedon 150
Butastur liventer 57
Cacomantis merulinus 77
Cacomantis sonneratii 76
Caprimulgus macrurus 82
Cecropis striolata 139
Centropus bengalensis 71
Centropus sinensis 70
Cerasophila thompsoni 137
Chalcoparia singalensis 190
Chalcophaps indica 68
Chloropsis aurifrons 186

Chrysococcyx maculatus 74
Chrysococcyx xanthorhynchus 75
Chrysomma sinense 163
Cinnyris asiaticus 191
Cinnyris jugularis 192
Columba livia 65
Copsychus saularis 173
Corvus levaillantii 127
Coturnix coromandelica 45
Crypsirina temia 126
Culicicapa ceylonensis 128
Cyornis banyumas 177
Cyornis sumatrensis 178
Cypsiurus balasiensis 84
Dendrocygna javanica 44
Dicaeum chrysorrheum 187
Dicaeum cruentatum 189
Dicaeum minullum 188
Dicrurus aeneus 119
Dicrurus annectens 118
Dicrurus hottentottus 121
Dicrurus leucophaeus 117
Dicrurus macrocercus 116
Dicrurus paradiseus 122
Dicrurus remifer 120
Dryonastes chinensis 162
Egretta garzetta 52
Eudynamis scolopaceus 73
Eumyias thalassinus 179

Falco peregrinus 101
Ficedula albicilla 181
Gallinula chloropus 62
Gallus gallus 46
Garrulax monileger 160
Garrulax pectoralis 161
Geopelia striata 69
Glaucidium cuculoides 81
Gracupica contra 170
Gracupica nigricollis 169
Halcyon pileata 87
Halcyon smyrnensis 86
Hemiprocne coronate 83
Hemipus picatus 102
Hirundo rustica 138
Hypothymis azurea 124
Iole propinqua 136
Ixobrychus cinnamomeus 48
Kittacincla malabarica 174
Lanius collurioides 113
Lanius cristatus 112
Lanius schach 114
Lonchura punctulata 198
Lonchura striata 198
Merops leschenaultia 92
Merops orientalis 91
Micropternus brachyurus 100
Mixornis gularis 157
Monticola solitaries 182

Motacilla alba 201
Motacilla cinerea 200
Muscicapa dauurica 176
Muscicapa sibirica 175
Myophonus caeruleus 180
Nyctornis athertoni 90
Oriolus chinensis 115
Orthotomus atrogularis 154
Orthotomus sutorius 153
Otus lettia 79
Otus sunia 80
Passer montanus 196
Pellorneum ruficeps 158
Pellorneum tickelli 159
Pericrocotus brevirostris 107
Pericrocotus divaricatus 110
Pericrocotus ethologus 108
Pericrocotus roseus 111
Pericrocotus solaris 106
Pericrocotus speciosus 109
Pernis ptilorhynchus 53
Phaenicophaeus tristis 72
Phylloscopus borealis 145
Phylloscopus claudiae 148
Phylloscopus coronatus 147
Phylloscopus fuscatus 141
Phylloscopus inornatus 144
Phylloscopus plumbeitarsus 146
Phylloscopus schwarzi 142

Phylloscopus yunnanensis 143
Ploceus philippinus 197
Pomatorhinus schisticeps 155
Porzana bicolor 60
Porzana cinerea 61
Prinia inornata 152
Prinia rufescens 151
Psilopogon asiaticus 96
Psilopogon faiostriatus 95
Psilopogon haemacephalus 97
Psilopogon lineatus 94
Psittacula finschii 42
Pycnonotus atriceps 129
Pycnonotus aurigaster 133
Pycnonotus conradi 135
Pycnonotus finlaysoni 134
Pycnonotus flaviventris 130
Pycnonotus jocosus 131
Pycnonotus xanthorrhous 132
Rhipidura albicollis 123
Sasia ochracea 98
Saxicola caprata 184
Saxicola ferreus 185
Saxicola maurus 183
Seicercus valentine 149
Sitta frontalis 166
Spilopelia chinensis 67
Spilornis cheela 54
Stachyris nigriceps 156

Streptopelia tranquebarica 66
Sturnia malabarica 172
Surniculus lugubris 78
Tachybaptus ruficollis 47
Terpsiphone affinis 125
Tringa glareola 64
Turnix suscitator 63
Upupa epops 93
Yungipicus canicapillus 99
Zosterops erythroleucus 164
Zosterops palpebrosus 165

Amphibians

Duttaphrynus melanostictus 218
Fejervarya limnocharis 215
Hoplobatrachus rugulosus 220
Hylarana erythraea 219
Kaloula pulchra 210
Leptolalax pelodytoides 213
Limnonectes gyldenstolpei 216
Limnonectes limborgi 214
Microhyla berdmorei 207
Microhyla butleri 211
Microhyla heymonsi 209
Microhyla mukhlesuri 208
Microhyla pulchra 206
Micryletta inornata 212
Occidozyga martensii 217

Philautus parvulus 222
Polypedates leucomystax 221

Reptiles

Calotes mystaceus 228
Calotes versicolor 227
Cyclemys oldhami 224
Dendrelaphis pictus 233
Dendrelaphis subocularis 234
Eutropis macularius 226
Eutropis multifasciatus 225
Gekko gekko 229
Hemidactylus frenatus 230
Hemidactylus platyurus 231
Hypsiscopus plumbea 242
Malayopython reticulatus reticulatus 244
Naja kaouthia 240
Oligodon fasciolatus 232
Ophiophagus hannah 239
Pareas macularis 241
Ptyas korros 235
Rhabdophis subminiatus 236
Subessor bocourti 243
Varanus bengalensis 245
Xenochrophis flavipunctatus 238
Xenopeltis unicolor 237















