

## ହାନ୍ଡିଲୋମିପି

หนังสือพิมพ์เพื่อผู้อ่านทุกระดับชั้น

# អាណាពេជ្ជកម្ម

ปีที่ 18 ฉบับที่ 620 ประจำวันที่ 11-20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ราคา 15 บาท

๘ ปีที่ 18 ฉบับที่ 620ประจำวันที่ 11-20 มีนาคม พ.ศ. 2550

# ມາພລ. ອໍານົວໃຫຍ່ປະຊາທິປະໄຕ

เชียงราย - อาการของโรคไข้หวัดนก อาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ มีระยะฟักตัว 1 ถึง 3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ ในผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจมีอาการรุนแรงได้ โดยจะมีอาการหอบหายใจลำบาก เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง โรคไข้หวัดนกต่างจากไข้หวัดใหญ่ คือในปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยจากการติดต่อของโรคไข้หวัดนกจากคนสู่คนผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก คือผู้ที่มีประวัติในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วย/ตาย ในพื้นที่เกิดโรคไข้หวัดนกระบาด, ผู้ที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวและมีความผิดปกติของปอดที่ชักเกร嫩มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้าย แม้จะให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะแนวทางปฏิบัติทั่วไปก็หายไม่ดี อาการไข้หวัดนกในสัตว์ชี้นำอยู่ กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของสัตว์อ่าย โรคแทรกซ้อน จำนวนเชื้อ ชนิดของเชื้อ แต่อาการที่พบได้ทั่วไปคือ สัตว์ชุมพร ซึ่งไม่กินอาหาร

衡阳 ไอ  
มาก หน้า  
ระบบประ  
กษาทันทัน  
เช่น ไก่ เน  
อย่างรวด  
หรือมีนก  
บ้าน ให้ท  
เพาหรือฝัง  
ใส่ซากสัตว์  
เชื้อ โรคหวัด  
สวมอุปกรณ์  
สติก / ถุงว  
ถังเมื่อให้  
เก็บตัวอย่าง  
การตาย โภ  
แน่นเก็บไว้  
ตรวจวินิจฉ  
สะอาดอย

กาม มีไข่ hairy ใจคำาก น้ำตาล  
รวม หงอนมีสีคล้ำและมีการ  
สาทและห้องเสียรายที่รุนแรงจะ  
ไม่แสดงอาการ เมื่อพบว่าสัตว์  
ด หรือนกที่เลี้ยงไว้ในบ้านป่วย  
ร่วงหรือผิดปกติมากกว่า 1 ตัวขึ้น  
ลงมาตามในบริเวณบ้านหรือ  
ลายชากระดับต่ำกว่าที่ทำ  
โดยการขุดหลุมลึกประมาณ 1 เม  
ตร ปักลงไปแล้วราดทับด้วยน้ำยา  
กลิ่นจากการสัมผัสชากระดับต่ำ  
ป้องกันร่างกาย เช่น สมุนไพร  
ที่ สามารถป้องกันเชื้อโรคที่เก็บ  
จากต้นที่หลังเก็บชากระดับต่ำ,  
ชากระดับต่ำที่ตายน้ำส่วนใหญ่  
ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุง  
กากน้ำแข็งแล้วเจาะ ส่งห้องปฎิบัติ  
โดยรอบของกรมปศุสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่  
กลังการเก็บชากระดับต่ำที่ทำควบ  
คุมที่ใช้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค